

- V** Nicht selten auf allen Alpen (Rich. 2 p. 85); Freschen (Glanz 1 p. 87), Alpe Bortla bei Damüls, vereinzelt (Bruhin 4 p. 217; 13 p. 754); Drejeralpe bei Schröcken, massenhaft (Bruhin locis cit.; 7 p. 119), einzeln zwischen Schröcken und Hoehkrumbach (Bruhin 7 p. 116, 119), Mittelberg (Bercht. 1 p. 22); Illgebiet: seltener und schwach auf Kalk: Gamperdonatal, gemein und robust auf dem Urgestein des oberen Teiles (Kemp 1 p. 155), Seesaplana (Killias & Theobald b. Bernoulli 1 p. 38, 39).
- L** Höhenbachtal bei Holzgau (Zimm.); Wettersteingebirge (Sternb. 6 p. 271).
- O** Paznaun: Jamtal (Peyr. b. DT. 9 p. 88).
- I** Alpen bei Innsbruck (VL. Hb. F.; Luerss. 1 p. 148), Zirlerchristen (Kot. Hb.), Kranebitterklamm (Zimm. Hb. F.), Brandjoch 1950 m auf einem glimmerigen Gestein; Sellrain: Längental 2000 m (K. 86), Lisens gegen das Horntal (Hb. b. H. 1 p. 1040, Hb. F.), Senderstal und ober Axams 13—2100 m (Handel 2 p. 27), Votschertal mehrfach, in Höhlungen unter dem Hochgraffjoch noch bei 2700 m (Handel 4 p. 291), Kematerhörnl (DT.); Stubai: Oberiß 16—1700 m, Waldrast 16—1800 m (K. 86), Mutterberg (S. Hb. F.); Gschnitztal: in Grünerlengelholzen am Antimoniköpl bei Trins 1600 m: forma umbrosa Kern. in Sched. ad Fl. exsicc. austro-hung. VII. (1896) p. 83 (F. Kern. b. K. 78^a Nr. 2702, 78^b VII. p. 83; K. 86), massenhaft und riesig hinter Laponnes von 1600 m an, daselbst steril und nur spannhoch unter Felsen noch bei 2200 m (K. 86; S. Hb. F.), Morgenköpfl am Glungezer 2235 m (Kot. Hb.), Vögelsberg gegen Vaz 1500 m (Handel 4 p. 291); Navis: unter der Klammeralpe (K. Hb.); Vennatal (Peyr. b. DT. 9 p. 88 etc.).
- U** Steinberg: am Nordfuße des Unnutz (K. 86); Kufstein: Thierberg, am Nordwesthange des Kegels mit dem Thierbergturm 700 m (Vollmann 1 p. 116), am Plateau des Zahnen Kaiser 1700 m (Hofer 1 p. 34).
- M** Zilalpen bei Meran, in der obersten Holzregion häufig (Bamb. Hb. F.); Nordseite der Laugenspitze (Lad. 3 p. 410).
- E** Innerpferssch (Pechlaner), Zeragalpe am Brenner (Peyr. b. DT. 9 p. 88); Senneralpe im Jaufental 1700 m an einer einzigen Stelle, aber hier massenhaft (Hut. b. K. 78^a Nr. 297, 78^b I. p. 113); Brixen: am Wege vom Fortscheller Joch nach dem Radisee (Bachl. 2 p. 22), im Walde am Wege nach Lüssen (Schm. b. Hofm. 10 p. 284; Bachl. 2 p. 22).
- P** Mühlwald (Rederl. b. H. 20).
- D** Bergeralpe in Virgen (Kell 1 p. 8).
- N** Malga di Malè in Rabbi (Venturi b. Gelmi 9 p. 25); Lavace-Alpe und am Mayrbach bei Proveis (Handel 4 p. 291).
- B** Im Gebiete von Bozen (Elsm. b. H. 1 p. 1040), am Möserwasser auf der Villandereralpe (H. 20; b. Luerss. 1 p. 148); fehlt am Schlern (Milde 29 p. 12; 31 p. 23).
- F** Fleims: Val Cadino (Gelmi 9 p. 25); Primör: Tognola-Alpe zwischen Caoria und San Martino (Ball 2 p. 463; b. Gelmi 10 p. 194), Castel Pietra gegen den Ceredapaß 970—1050 m, Val Pradidali 1350—1600 m, Agnerola-Alpe 16—1900 m (Paol. 1 p. 12, 14, 22).
- T** Im Walde oberhalb Molveno; Valsugana: Val Sorgazza gegen die Cima d'Asta (Gelmi 9 p. 25).
- [**R** Nach Trevisan in den Lessinerbergen rechts vom Passo della Lora (Goir. 3 XIV. p. 36).]