

K An Tonschieferfelsen im Jochbergwald (Ung. 8 p. 273; Trst. b. H. 1 p. 1048).

M Laas (Tpp. b. H. 1 p. 1048); Passeier (Schramm 2 p. 92); Meran, gemein (Eschenl. b. H. 1 p. 1048; Bamb. b. H. 1 p. 1514; Milde 13 p. 434, 446; 30 p. 1, 3; Entl. 1 IV. p. 118 etc.); Lana (Pfaff).

E Am Wege oberhalb Mareit (Fischn. Hb.; S.), Sprechenstein (K. 86; Fischn. Hb.); Mittewald (Martens 1 p. 362); gemein um Brixen bis in die Alpen (Schm. b. H. 1 p. 1514; Bachl. 2 p. 23; S.).

P Taufers (Isser Hb. F.; S.); Bruneck (Marie v. Kern b. H. 1 p. 1048; Schönach); Palfrad (S.); Pieve di Livinallongo, ca. 1450 m (Molendo 5 p. 99); Prags; am Uebergange nach Maistatt auf schwarzem Kalk an einer einzigen, beschränkten Stelle (H. 20).

D Innichen (Diettr.); Sexten (Buchner); Lienz (Rschf. 1 p. 222).

N Pejo, Rabbi (Gelmi 9 p. 26); Uebergang von Laurein nach Proveis (Pfaff), Mocenigo di Rumo (Loss Hb. F.).

B Verbreitet auf Schiefer, Quarz- und Augitporphyr von den Niederungen bei Bozen, ca. 300 m, bis 1650 m am Ritten (H. 1 p. 1048; 20) und auf die Seiseralpe — wie hoch? — (Schunck 1 p. 336; Kneucker 1 p. 414); bei Salurn (H. 1 p. 1048). Die Angabe für das Schlernplateau bei Lbd. 8 p. 444 dürfte dagegen zu *A. Seelosii* gehören.

F Fassa; Canazei gegen Mortitsch, ca. 1500 m (S.), Campidello (Ostern. 1 p. 156); Fleims: „in fissuris rupium a Corozo“ (Scopoli 2 p. 67), Altrei, Molina, Cavalese, Mezzavalle (S.).

G Pinzolo (Pfaff); Tione auf Tonalit (S.); Daone (Porta b. H. 20).

T Auf krystallinischen Gesteinen: Gocciadoro bei Trient 300 m, Pinè, Fersinatal, Palù, Vetriolo, oberhalb Roncegno (Gelmi 9 p. 26), Calceranica (Murr), Cima d'Asta (Petrucci b. Bertol. 3 I. p. 65), an der Canzanastraße in Valsugana (Pfaff).

R Rovereto; an Basaltfelsen eines Hügels südlich von Castel Pradaglia 200 m (G. Cob. 1 p. 78). „Mihi saepe occurrit in rupestribus montium Tridentinorum . . . Seguietus [l. p. 70] decerpit in monte Tridentino Vignola . . .“ (Poll. 3 III. p. 285). „Habui ex Baldo a Toninio“ (Bertol. 3 I. p. 65); Revoltopaß (A. Massalongo b. Goir. 3 XIV. p. 40).

6. (17.) *A. Seelosii* Lbd. in Flora XXXVIII. (1855) p. 81 (dto. 31. Dec. 1854, publiciert 14. Febr.), 348, 414, tab. XV., Hsm. in Oesterr. bot. Wochenschr. V. (1855) p. 132 (dto. Jänner, publiciert 26. April)*, Bertol., Fl. ital. crypt. I. (1858) p. 66, Mettenius in Abh. Senckenberg. naturforsch. Ges. III. (1861) p. 186, Bolle in Bull. soc. bot. France VII. (1860) p. 72—80, 82—86, Bonplandia IX. (1861) p. 2—4, 18—23, Fehlnr in Oesterr. bot. Zeitschr. XXXIII. (1853) p. 353, *A. tridactylites* Bartl. in sched. (1844), *A. septentrionale* var. *tripartitum* G. Seelos in sched. (1854), *Acropteris Seelosii* Hfl. in Verh. zool. bot. Ver. VI. (1856) p. 345. — Luerss. l. c. p. 209; A. u. G. l. c. p. 64; Hfl. l. c. p. 345.

* Hieraus, namentlich aber aus der auf p. 133 angehängten Nachschrift dto. 26. Februar 1855, ist übrigens zu ersehen, daß Hausmann sein *A. Seelosii* ganz selbständig, und ohne von Leybolds Absichten etwas zu wissen, benannt und beschrieben hat.