

auch p. 434. 436 u. 6 p. 27), in unendlicher Menge stellenweise um Meran, besonders an schattigen Abhängen bei 520 m unter Quereis lanuginosa, namentlich zwischen Gratsch und Algund, auch an Dorf- und Weinbergsmauern mit *Ceterach officinarum* nicht selten (Milde 31 p. 29), gemein an sonnigen Abhängen (Entl. 1 IV. p. 118; Peyr. b. DT. 9 p. 90; Pfaff). Hier zuerst von Krafft in einem Wäldchen am Mooshofe bei Untermais gefunden (Hb. F.), im Naiftale bis 900 m (Lad.).

E Brixen (Eschenl. Hb. F. und danach b. Hfl. 1^b p. 250; Schm. Hb. F.): Vahrn, Elvas (Heimerl 2 p. 450, 452), in Weinbergen, im Gesteine des Krakofler Hügels; Schm., Hofm. Es kommt in zwei Formen vor, in der gewöhnlichen kleineren und in einer üppigeren, die in *A. acutum* W. überzugehen scheint; Schm. (Hofm. 10 p. 285). Selten hinter Seeburg und ober dem Schlosse Krakoff und zwar die südliche Form; die gewöhnliche auch, aber sparsam, ober Milland an der Grenze der Wiesen unter St. Andrä, dann am Wege zwischen Mellaun und Klerant (Bachl. 2 p. 23), Klerant (S. Hb. F.).

[P Die Angabe: „Hin und wieder“ (Hut. 6 p. 62) ist nach Huter in litt. dto. 24. April 1905 zu streichen.]

B Sarntal: vor dem Johanneskogel (Peyr. b. DT. 9 p. 90), am Ritten, wiewohl sehr selten bis 1100 m am warmen Felsabhang des Pipereyer bei Klobenstein (H. 1 p. 1048, Hb. F.); bei Kastelruth noch bei etwa 975 m (Milde 31 p. 29), bei Völs, kümmerlich (Tschurtschenthaler b. Milde 29 p. 13), Atzwang (Peyr. l. c.; Wettst.); um Bozen gemein an sonnigen Abhängen und Felsen (Harg. 1 p. 442; Hfl. 3 p. 4; H. 1 p. 1048, Hb. F.; K. Hb.; Peyr. l. c.; Pfaff etc.); Ueberetsch (Eschenl. Hb. F.; Hfl. b. H. 1 p. 1048, Hb. F.; Freiseisen Hb. F.; Peyr. l. c.).

[F Die Angabe „Fassa“ bei Ambr. 13 p. 65 ist schon mit Rücksicht auf die Meereshöhe offenbar unrichtig und wird auch von Gelmi mit Stillschweigen übergangen.]

T Trient: bei Gocciadoro (Gelmi 3 p. 37); Pinè (Gelmi 9 p. 29); Moccheni-Tal (Gelmi 10 p. 195), Canzolino bei Pergine (Gelmi 9 p. 29), Caldonazzo-See (Hfl. 23 p. 321); Tezze (Ambr. 13 p. 65).

R Rovereto: in einem Eichengehölze südlich von Castel Pradaglia (G. Cob. 1 p. 78); Monte Baldo (Sternb. 5 p. 55); ai Lavaci und gegen Pian della Cenere über 1000 m (Poll. 1 p. 113).

Var. *lanatifolium* Hfl. — Luerss. l. c. p. 270; A. u. G. l. c. p. 73.
Die gewöhnliche Form.

Var. *argutum* Kaulf. — Luerss. l. c. p. 270; A. u. G. l. c. p. 73.

M Meran: Weinbergsmauern bei Algund und Gratsch (Luerss. 1 p. 271).

B Ritten: Kleinstein; Bozen: Siebenaich, Haslacher Wald (Luerss. 1 p. 270, 271), Sigmundskron (H. Hb. F.), Bozen (F. Saut. b. K. 78^a Nr. 298, 78^b I. p. 113, rev. Luerss.).

T Caldonazzo-See (Hfl. Hb. F.).

Var. *obtusum* (Kit.), *A. obtusum* Kit. — Luerss. l. c. p. 271; A. u. G. l. c. p. 73.

M Meran (Milde 13 p. 446): Felsen ober Algund (Luerss. 1 p. 265, 171).

E Brixen: Krakoff (Luerss. 1 p. 271).