

**F** Paneveggio (S.); Primör: San Martino (Gredler b. H. 20; Paol. 1 p. 17), Val Pradidali 1350—1650 m (Paol. 1 p. 14).

**T** Trient: Monte Bondone (Gelmi 1 p. 72), Santa Agata (VL. Hb. F. u. b. H. 20); Valsugana (Ambr. 13 p. 71); Val Tesino (Sonklar 3 p. 280).

**R** Ceř (Hepp.); Serrada (R. Cob. 6 p. 77; 8 p. 30); Rovereto (Crist. Hb. F.); Monte Baldo (Sternb. 5 p. 55); Revoltopaß (Goir. 3 XIV. p. 43).

3. (30.) **Ph. Robertiana** (Hoffm.) A. Br., *Polypodium Robertianum* Hoffm., *Aspidium Robertianum* Luerss., Aschers. u. Gr., Syn. I. p. 22. *Polypodium calcareum* Sm. — Luerss. l. c. p. 305; A. u. G. l. c. p. 22.

An ähnlichen Standorten wie Vorige, vorwiegend auf Kalk.

**V** Häufig bis in die Alpen; doch liegen aus dem Schiefergebiete Montafons keine speciellen Daten vor.

**L** Verbreitet (Kink b. H. 1 p. 1039; Zimm.; B. Moll; S.).

**O** Zwischen Flirsch und Strengen auf Kalk; Obladis; Roppen auf Kalk (S.).

**I** Häufig in den nördlichen Kalkalpen, bis in die Niederungen des Inntales herab; südlich des Inn: Peterbrünnl und Paschberg bei Innsbruck (Peyr. b. DT. 9 p. 88); Stubai, häufig auf Kalk (Eschenl. Hb. F.; Barth b. H. 20; K. b. S. 4 p. 389); Gschnitztal, ebenso, jedoch auch auf Schiefer, bis ca. 1700 m (K. 86; F. Kern. b. K. 78<sup>a</sup> Nr. 1509, 78<sup>b</sup> IV. p. 91; S.); Obernberg (K. 86); Vennatal (Peyr. l. c.); Kogelmoos bei Schwaz (Pusch 1 p. 352).

**U** Achental; Steinberg (K. 86), Brandenburg (Zall. b. H. 20); Sonnwendjoch; Alpach (Längst *ibid.*); gemein um Kufstein (Juratzka 9 p. 23; Hofer 1 p. 34; 2 p. 48 etc.).

**K** Falkenstein im Brixentale (Kögeler Hb. Gymn.); Kitzbühel in Wäldern (Trst. Hb. F.); vergl. auch *Ph. dryopteris*!

**M** ? Stilsferjoch (Peyr. 3 mit ?; b. DT. 9 p. 88); Meran: Töll, Algund (Entl. 1 IV. p. 118), Gratsch, nicht selten (Milde 13 p. 446), Marlinger Waal (Milde 30 p. 1); Lanaer Wasserleitung (Entl. l. c.); Naiftal (Bamb. Hb. F.).

**E** Brennerbad (Peyr. b. DT. 9 p. 88); Sterzing (Schm. 1 p. 46), Rust (Fisch. Hb.); Brixen: am Wege nach Lüssen (Pfaff), an der Plose bis 2000 m (Kleb. 1 p. 62), in Afers (Bachl. 2 p. 22).

**P** Steinhaus im Ahrntal (H. 20); Wälder und schattige Orte der Kalkalpen (Hut. 6 p. 61; H. 20; S.).

**D** Winnebach, in Menge hinter der Nikolaikirche, verschwindet aber allsogleich, sowie der Schiefer aufritt (Außerd. b. H. 20); Bergeralpe in Virgen, ausschließlich auf Kalk (Kell 1 p. 5, 38); Bad Innichen (Diettr.); Lienz: am Wege zur Kerschbaumeralpe (Hut. Hb. F.).

**N** Nonsberg (Gelmi 9 p. 30); Cis (Loss Hb. F.), Ruffrè (S.).

**B** Verbreitet auf Kalk; außerdem: Dreikirchen [im Schiefergebiete] (Pfaff), Rittneralpe am Roßwagen (H. 20), Ritten: auf einem verlassenen Sandsteinbruche ober Kematen bei 1485 m am sogenannten Klee (H. 1 p. 1039); im Eisaktale bei Steg (Pfaff); Seis auf Augitporphyr (H. 20); Bozen, häufig auf Quarzporphyr; Talferbett hinter Ried (H. Hb. F.), Sigmundskron (Lbd. 14 p. 308), Kühles Brünnl (H. 1 p. 1039; Pfaff), St. Isidor und Kollern (Pfaff).

**F** Fassa: oberhalb Campitello, ca. 1500 m (S.); Fleims (Gelmi 9 p. 30).