

Subforma β *pseudosilvatica* Milde. — Luerss. l. c. p. 694; A. u. G. l. c. p. 131.

V Nicht selten bei St. Gerold (Bruhin 13 p. 756).

I Innsbruck; Ahrntal, in feuchten Hecken (S. Hb. F.).

M Meran: bei Partschins (Isser Hb. F.).

P Ahrntal (? in Hb. K.).

B Um Ratzes zwischen Gebüsch, sehr sparsam (Milde 18 p. 13; 29 p. 14; 31 p. 97; 32 p. 221); Bozen: an der Straße nach Leifers auf Sand und Schotter (H. Hb. F.).

Subforma γ *decumbens* G. F. W. Meyer. — Luerss. l. c. p. 694; A. u. G. l. c. p. 131.

Auf Aeckern überall gemein (Luerss. 1 p. 694).

V Häufig (Bruhin 3 p. 55; 13 p. 756; Zimmerm. 1 p. 2; Rich. 2 p. 84).

I Verbreitet, vorzüglich auf Schotter und Gerölle.

M Meran, häufig auf Sandflächen (Entl. 1 IV. p. 119).

B Auf Aeckern um Ratzes (Milde 18 p. 12; 29 p. 14); Bozen: hie und da in Weinbergen an den Schotterhäufen (H. 20).

T Trient: in einem Graben am linken Fersina-Ufer (VL. Hb. F.).

R Loppio (Kot. Hb.).

Subforma δ *alpestris* Wahlenb. — Luerss. l. c. p. 694; A. u. G. l. c. p. 131.

Fast nur im Hochgebirge (Luerss. 1 p. 695).

Tirol (Pokorny 1 p. 9 „nach Original Exemplaren“).

V Kalkalpen Vorarlbergs (Döll 2 I. p. 59); Bregenz, in den Niederungen, Mehrerau und an der Bregenzerach (Bruhin 1 p. 60 als *E. arvense* f. *decumbens*; 3 p. 55); Schröcken (Döll l. c.; Bruhin 7 p. 119); Walsertal (Bruhin 4 p. 218; 13 p. 756).

O Oetztal: auf Sandboden an der Ache bei Sölden (Hfl. Hb. F.).

I Gschnitztal: Muttenjoch (S. 1 p. 58).

E Brixen: Bergwiesen bei Burgstall und am Freien Bühel 10—1400 m (Kleb. 1 p. 63).

P Hin und wieder auf höher gelegenen Orten (Hut. 6 p. 61); Taufers: Klausen bei Steinhaus (Treffer b. Schönach 2 p. 22), Ahrntal, Lappach 1260—2200 m (Außerd. in Hb. F., Hb. K.).

D Schlattenkees am Venediger 1740 m (H. Hb. als *E. glaciale*; b. Milde 31 p. 98; 32 p. 222; b. Luerss. 1 p. 694); Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 564).

N Tonale (Gelmi 13 p. 320).

B Auf dem Rittnerberge in Menge bei 1420 m auf einer Bergwiese östlich von Kematen (H. b. Koch 11 ed. 2 p. 964; b. Bertol. 3 I. p. 8; H. 1 p. 1026, Hb. F.), Oberbozner Torfmoor bei 1450 m (H. b. Milde 32 p. 222; b. Luerss. 1 p. 695); Schlern bis ca. 2500 m [„bis 8000“] (Milde 32 p. 222, 232).

F Fleims: San Pellegrino (Gelmi 10 p. 191).

T Monte Bondone bei der Quelle delle Viotte (Gelmi 15 p. 76).

Forma c) *nemorosa* A. Br. — Luerss. l. c. p. 695; A. u. G. l. c. p. 131.

V Dornbirn (Zimmerm. 1 p. 2); häufig um St. Gerold und überhaupt in ganz Vorarlberg (Bruhin 3 p. 54; 4 p. 218; 13 p. 756).