

Var. *oligocarpon* (Aongström), S. *oligocarpon* Aongström,
S. *minimum* var. *oligocarpon* Aschers. et Gr. — A. u. G. l. c. p. 292;
Graebner l. c. p. 23.

B Sarnercharte mehrfach (H. b. Aschers. & Gr. 1 p. 292).

12. Fam. *Potamogetonaceae**).

33. *Potamogeton* L., Laichkraut.

1. (111.) **P. natans** L. — A. u. G. l. c. p. 303.

In stehenden und langsam fließenden Gewässern bis in die Voralpenregion.

V Häufig in der Ebene des Rheintales; Schwarze Lacke bei Göfis (Ohnes. b. Rich. 2 p. 73); bei Lautrach eine f. *angustifolia*, „foliis submersis anguste lanceolatis = *P. natans* intermedium Koch D. Fl.“ Custer Mscr. (Cust. b. Bruhin 3 p. 50).

L Plansee (S.).

O Trams bei Landeck (S.); Imst (Lutt. 1).

I Häufig in allen Wasserbecken um Leutasch und Seefeld, bis 1500 m (K. 86; S.; Hellw.), am Seefeldersee eine der var. *sparganiifolius* Almq. sehr nahestehende Form (Murr 55 p. 146); Affling (DT.), Amrasersee (Schpf. 1 p. 40, Hb. F.; S. Hb. F. etc.), Lans (Kravogl; Murr 1 p. 16 etc.).

U Achensee (K. 86); an der Zillermündung (Längst b. H. 20), Fügen (Kot. Hb.); Brixlegg (K. 86).

M Reschensee 1475 m (K. Hb.); Jochersee bei Meran (Entl. 1 III. p. 165).

E Kematen in Pfitsch (K. Hb.).

D Kals: Lesacher Wiesenberge in der sog. Lubisenlache (Hinterh. u. Hut 1 p. 561); am Kreuzberg in Sexten knapp jenseits der Grenze 1600 m (Fech. b. H. 1 p. 819; 6 p. 48), ebendort bei 1500 m var. *vulgaris*, übergehend in var. *prolixus* (Außerd. Hb. F., det. Fischer).

N „Saepe vidimus et legimus, praesertim in lacubus quibusdam in Ananiensium agro quam ibi una cum *Nymphaea aquis supernatantem* deprehendimus“ (Mattioli 1 ed. 1565 p. 1137); Fondo (DT.).

B Ritten: bei Klobenstein und Kematen (H. 1 p. 820, Hb. F.), Oberbozen (Zivny); Seiseralpe am Fuße des Schlers (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 768), Völs (H. ibid.; Fech. l. c.); Sigmundskron (Lbd. 14 p. 307), Montikl, Leifers (H. 20); lago d'Antenon (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 596; b. H. 1 p. 820) und Lavazzé im Eggentale (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 768), letzterer Standort bei 1800 m; Salurn (Pfaff).

G Baitoni bei Storo (Cimarolli).

T Santa Massenza, Toblino (Ambr. 3 p. 380); Romagnano, Trient (Gelmi 3 p. 34); Lago di Serraia in Pinè (VL. Hb. F.); Monte Rovere (Graziadei b. Gelmi 15 p. 75).

[**R** Am Gardasee und Monte Baldo, jedoch außerhalb der Grenze.]

*) Anordnung nach Aschers. P. und Graebner P., Synopsis der mitteleuropäischen Flora I. Band p. 294—366 (1897). Das bezügliche Material im Herb. Ferdinandeum wurde von Herrn Prof. Dr. Georg Fischer in Bamberg revidiert.