

7. (117.) *P. Zizii* Mert. et Koch, ? *P. lucens* × *gramineus*. — A. u. G. l. c. p. 319.

**V** „In Gräben gegen den Bodensee und Fussach Cust. Herb.“ (Bruhin 3 p. 50), worauf sich folgende Stelle bei Custer 3 bezieht: „in herbario nominavi: var. convoluta an var. Zizii Koch Syn.? — folia inferiora limbo reapse orbata et fere ad nervum medium reducta itidem; — sed hic limbus sive lamina folii originaliter deest, non per foliorum substantiae corruptionem destructa“.

**B** Girlaner Lacke (Hb. Hb. F. als *Potamogeton* . . . . ., von Fischer als *P. Zizi* var. *sublacustris* Fischer, dem *P. gramineus* var. *lacustris* Fr. sehr nahestehend, bestimmt).

8. (118.) *P. gramineus* L. — A. u. G. l. c. p. 321.

Var.  $\alpha$  *graminifolius* Fr., *P. heterophyllus*  $\gamma$  *elongatus* Mert. et Koch. — A. u. G. l. c. p. 322.

a. *fluviatilis* Fr. — A. u. G. l. c. p. 323.

b. *lacustris* Fr. — A. u. G. l. c. p. 323.

Var.  $\beta$  *heterophyllus* Fr., *P. heterophyllus*  $\alpha$  *foliosus* Mert. et Koch, *P. augustanum* Balbis. — A. u. G. l. c. p. 323.

a. *stagnalis* Fr. — A. u. G. l. c. p. 324.

b. *terrestris* Fr. — A. u. G. l. c. p. 324.

**V** In den Gräben des Bodenseeriedes bei Bregenz:  $\alpha$  und  $\beta$  (Cust. 1 p. 92; 2 p. 399, Hb. F.:  $\beta$  b.; Saut. 11 p. 12, 15, 16; b. H. 1 p. 821; Ebner in Hb. K.). Sauter l. c. p. 16 schreibt darüber: „Der hier sehr gemeine *P. gramineus* (*heterophyllus*) kommt unter den Formen *foliosus* und *paucifolius* mit fast schuhlangen Blütenstielen vor und stellt *P. lucens* gleichsam im Kleinen dar; unter den Formen *elongatus* und *latifolius* erscheint er auch mit durchaus lineal-lanzettlichen und schmal-linealischen sehr verlängerten ( $\frac{1}{4}$ , 5 Zoll) durchaus untergetauchten Blättern.“ Bregenzerwald:  $\beta$  a. (Ebner & Glanz Hb. F.).

**I** Oberleutasch gegen Buchen:  $\beta$  (Murr 11 p. 238). Seefeld (K. Hb.:  $\alpha$ ; Hellw.:  $\alpha$  und  $\beta$ ; Murr 13 p. 48); Flaurling:  $\alpha$  a. (Murr 7 p. 87, Hb. F.), Hatting (Murr); Höttingerau (Grembl.; Zimm. Hb.), Völs (Hellw.), Amras (K. Hb.:  $\beta$ ; Murr 2 p. 389, Hb. F.:  $\alpha$  a. und  $\beta$ ), Egerdach (Zimm. Hb.), Tämpel bei der Lanser Kapelle (Murr 76 p. 153).

**U** Im Achensee nahe bei dessen Ausflusse:  $\alpha$ , bei der Buchau:  $\beta$  b. (K. Hb.); Zillertal: im Mitterdorfersee:  $\alpha$  b. (Glanz Hb. F.).

**E** Brixen: bei Naz:  $\beta$  a. (Schm. Hb. F.; b. H. 1 p. 1485 sub var.  $\alpha$ ; Bachl. 1 p. 74).

**B** In einem Teiche bei Völs (Viehw. b. H. 1 p. 1485:  $\alpha$ ; Wörndle b. H. 1 p. 1485:  $\beta$ ); im „Holz“ bei Eppan:  $\alpha$  (Stocker b. H. 1 p. 1485).

**T** Andalo (Gelmi 15 p. 75); in Gräben bei Brusago in Pinè:  $\beta$  (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 596; b. Ambr. 4 I. p. 771; b. Gelmi 10 p. 155; Fech. 5 p. 16), ebendort:  $\alpha$  (Sard. Hb.).

9. (119.) *P. crispus* L. — A. u. G. l. c. p. 335.

**V** Bregenz (Saut. b. H. 1 p. 822): „Der hier seltene *P. crispus* erscheint in einer durch verlängerte (3–4 Zoll lange) spitzige, glatte, nicht welligt krause Blätter sehr abweichenden Form, von der ich jedoch keine Früchte sah“ (Saut. 11 p. 15); „varietas adest foliis minime undulatus solum evidenter serratis“ (Cust. 1 p. 92); Rheintal,