

1902 in großer Schönheit und fruchtend in dem Bache gegen Breitenwang (Fischer).

I Leutasch-Platzl (F. Saut.), in einem rasch fließenden, kalten, klaren Bache nördlich von Seefeld förmliche Bestände bildend (K. Hb.; b. Fritsch 9 p. 364, 365); Innsbruck: in Gräben am Fuße des Berges bei Allerheiligen (Murr 1 p. 15 als *P. pectinatus*), massenhaft im Gießen in der Höttingerau, einem kalten Quellbache, mit *Zannichellia* (Hb. b. H. 1 p. 823, Hb. F. als *P. pectinatus*; K. Hb.; b. Fritsch 9 p. 364, 365; Zimm. und S. b. K. 78^a Nr. 2693, 78^b VII. p. 81; Hellw. b. Dörf. 1^a Nr. 4080, 1^b II. p. 20), hier von Tiselius 1883 auch mit gut entwickelten Früchten gesammelt (Tiselius 1 p. 281; b. Fritsch 9 p. 365), in einem Altwasser längs des Inn unterhalb Egerdach (K. Hb.; b. Fritsch 9 p. 364, 365; Zimm. Hb. F.), hieher wohl auch der *P. „pectinatus“* von außer Amras, Hallerau (Hepp. b. H. 1 p. 1485). G. Fischer vermutet auf Grund anatomischer Untersuchungen, daß ein Teil der hier einschlägigen Pflanzen *P. pectinatus* L. \times *filiformis* Pers. sein könne; er ist mit weiteren Untersuchungen beschäftigt und hofft diese Frage bald zum Abschlusse zu bringen.

17. (127.) *P. densus* L. — A. u. G. l. c. p. 354.

Var. α *rigidus* Opiz, *P. densus* L., *P. densus* α Mert. et Koch. — A. u. G. l. c. p. 354.

Var. β *serratus* (L.), *P. serratum* L., *P. densus* β *lancifolius* Mert. et Koch. — A. u. G. l. c. p. 354.

Var. γ *setaceus* (L.), *P. setaceus* L., *P. densus* B. II. *setaceus* Aschers. et Gr., *P. densus* γ *angustifolius* Mert. et Koch. — A. u. G. l. c. p. 355.

V Im Rheintale und Walgau gemein in allen Varietäten (Cust. 1 p. 92; Saut. b. H. 1 p. 824; Höfle 1 p. 137; Bruhin 3 p. 50; Kemp 1 p. 120; K. 86; Aichinger 2^a p. 290; Zimmerm. 1 p. 4; Rich. 2 p. 73).

L Reutte: am Lech bei Ebenbichl (Ebner Hb. F.), bei Reutte an einem Lecharm häufig (Grembl. nach Hellw. in litt.).

I Aeußerst selten in Gräben um Innsbruck (K., Grembl. b. Murr 2 p. 389 — was auf einer schriftlichen Mitteilung Grembl. an DT. beruht, während von Kerner selbst keine Notiz vorliegt), im Gießen der Hallerau (Grembl. Hb.).

U Sümpfe bei Rattenberg (Längst b. H. 20), Voldöpp (Engensteiner); zwischen Kundl und Wörgl (Kot. Hb.); bei Ebbs (Trst. 1841 nach Murr 2 p. 389).

B Salurn, in Gräben (F. Saut. 5 p. 355).

G Quellen bei Stenico (Loss Hb. F.).

T Bei Vezzano und gegen Terlago (Murr 60 p. 102); Romagnano (Gelmi b. Sard. 3 p. 76; Gelmi 3 p. 34; 10 p. 155); Lago della Serraiia in Pinè: γ (Fech. 5 p. 17; b. Ambr. 4 I. p. 774; b. Gelmi 10 p. 156).

R In Gräben bei Arco, Riva und Torbole (Fech. b. Bertol. 2 V. p. 608; b. Ambr. 4 I. p. 775; Fech. 5 p. 17, Hb. F.; Spieker 1 p. 379; Hut. Hb. F.; Porta b. Dörf. 1^a Nr. 4079, 1^b II. p. 20; Kot. Hb.).

34. *Zannichellia* L., *Zannichellie*, Teichfaden.

1. (128.) *Z. palustris* L. — A. u. G. l. c. p. 361.

Var. α *repens* (Bönningh.), *Z. repens* Bönningh., *Z. palustris* β *repens* Koch. — A. u. G. l. c. p. 362.