

V Flexen, gegen den Trittkopf (Eggler b. Rich. 5 p. 340); am „Riedboden“, Uebergang aus dem Vermaldentobel zur Wasserstubenalpe im Silbertale (Loitlesb., Rich. b. Rich. 1 p. 84; 2 p. 73).

L Bei Heiterwang (Grembl.).

I Scharnitz (Glanz b. H. 20), Wildmoos bei Seefeld (K. 14 p. 366, Hb.); Walderalpe (Grembl. Hb.); Gleinsermoor bei der Waldrast 1700 m (Glanz & Roth Hb. F.; F. Saut.; K. b. S. 4 p. 379). Der angebliche Standort hinter dem Spitzbühel bei Innsbruck, woselbst Murr die Pflanze nicht finden konnte (12 p. 299), beruht auf einer Notiz von DT.; siehe DT. 21 p. 10.

U Bruxermoos im Achentale (Pichler Hb. F.); häufig auf den feuchten Wiesen bei Voldöpp (Längst b. H. 1 p. 1485); Kufstein: Längensee (K. Hb. F.), Egelsee, Hintersteinersee (Eigner), Weiher bei der Schanz (C. F. Mayer).

K Kitzbühel; am Schwarzsee (Saut. 7 p. 479; Ung. 8 p. 291; Trst. b. H. 1 p. 818, Hb. F.).

B Deutschnoven (Vieh. b. H. 1 p. 1485).

Die Aequatorialgrenze dieser Art zieht von der Schweiz über Deutschnoven nach Hermagor.

37. Triglochin L., Dreizack.

1. (132.) **T. palustris** L. — A. u. G. l. c. p. 377; Buchenau l. e. p. 9.

Auf mageren sumpfigen Wiesen, an Pfützen, Gräben, Quellstümpfen, nassen Wegrändern.

V Im Rheintale und Illgebiete häufig bis in die Alpen (Rich. 2 p. 73).

L Elbigenalp (B. Moll Hb. F.); Reutte (Kink b. H. 1 p. 819).

O St. Anton am Arlberg (S.); Fimberjoch (Peyr. b. DT. 9 p. 76 — wohl Fimbertal); Fließ, Piller, Prutz (Hellw.), Öbladis (K. 86); Zams (Hellw. b. Kn. 2^b H. p. 25); Strad bei Imst (Lutt. 1); Telfs (S.).

I Häufig, besonders auf Kalk, bis 1800 m: Längental bei Lisens (Pkt. b. H. 1 p. 819), Nordabhang des Glungezer 1800 m (Handel). Nicht beobachtet im hinteren Stubai und in den südöstlichen Seitentälern.

U Häufig nördlich des Inn und im Innale; Zillertal: Uderns (Kot. Hb.), Mitterdorf (Gebh. b. H. 1 p. 819).

K Kössen (Pichler b. H. 20); Kitzbühel (Ung. 8 p. 291); Hochfilzen (Pichler l. e.).

M Meran (Bamb. b. H. 1 p. 1485 etc.); Nals (Lad.).

E Häufig.

P Welsberg (Hell b. H. 1 p. 819); Niederdorf (Diettr.); häufig südlich der Rienz; auf Falzarego in Ampezzo bei ca. 1600 m (S.).

D Verbreitet; auch in den Tauerntälern und auf kalklosem Schiefer (siehe Kell 1 p. 5).

N Tonalepaß (Rota 1 p. 80); um Cles (Loss, VL. Hb. F.).

B Gemein am Ritten, bis 1700 m (H. 1 p. 1485); Seis (H. 20), Völs (VL. Hb. F.), Seiseralpe (Hb. b. H. 1 p. 819; Lbd. 8 p. 437); Bozen; in der Au (Elssm. 1 p. 510), Etschmöser bei Sigmundskron (Lbd. 14 p. 309); Truden (Kot. Hb.).