

2. (142.) *Ph. arundinacea* L., *Digraphis arundinacea* Trin., *Baldingera arundinacea* Dumort. — A. u. G. l. c. p. 23.

An Gräben und Ufern.

V Häufig in den sumpfigen Niederungen des Rhein- und Illtales bis Bludenz (Cust. 1 p. 78; Saut. b. H. 1 p. 961; Kemp 1 p. 125; Hasler 1; Aich. 2 p. 291; Zimmerm. 1 p. 5; Rich. 2 p. 80).

L Haldensee in Tannheim 1150 m (Zimm.).

O Fließ (Hellw.); unterhalb Oetz (K. 86).

I Seefeld 1180 m (K. 86); verbreitet im Inntale: Zirl gegen Inzing (K. 86), Völs gegen Kematen (S.), um Innsbruck (Schpf. 1 p. 18, Hfl., Schm., Pkt. b. H. 1 p. 961; K. 86 etc.), bei Fritzens (S. Hb. F.), Vomp (Reis. b. H. 1 p. 1503).

U Achensee (K. 86); am Inn bei Rattenberg (Längst b. H. 20).

K An der Kitzbühler Ache [nicht Alpe] bei Oberndorf, nicht häufig (Ung. 8 p. 275), Kitzbühel: an der Ache (Trst. b. H. 1 p. 961).

M Gräben bei Plaus (Entl. 1 IV. p. 28).

E Sterzing: im Ausflußgraben des Deutschhausweihers 940 m (Fischn. Hb.); Brixen (Hofm. b. H. 1 p. 961; Bachl. 1 p. 84; S.).

P Antholzer See 1642 m (!) (H. 20).

N Fondo, massenhaft (DT).

B Bozen; Branzoll (H. 1 p. 961); Neumarkt (Pfaff); Salurn (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 574).

T Mezzolombardo (Murr); Trient (Ambr. 4 I. p. 26; VL. Hb. F.); Valsugana (Ambr. l. c.), Caldonazzo (Kot. Hb.), Levico (Broso).

R Arco, Riva (Ambr. 4 I. p. 26); Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 961; Ambr. l. c.; G. Cob. 1 p. 71).

Monstr. picta (L.), *Phalaris picta* L. — A. u. G. l. c. p. 24.

L In einem Sumpfe bei Reutte (Glanz b. H. 20).

O Ladis (Mik 3 p. 81).

B Seis: 1866 an einem Wassergraben beim Darnmüller; Bozen: 1866 im Talferbette zwischen dem Wunderhof und der Talfer unter der Brücke mit *Carex vesicaria* (H. 20).

T Trient: auf Sumpfboden beim Palazzo delle Albere wie wild (Murr 114 p. 42).

Außerdem häufig in Gärten gepflanzt und aus diesen verwildernd.

47. *Anthoxanthum* L., Riechgras (Ruchgras).

1. (143.) *A. odoratum* L. — A. u. G. l. c. p. 24.

Auf trockenen Wiesen, Triften, grasigen Waldplätzen, gemein von 100—200 m: Arco (Diettr.) und Rovereto (G. Cob. 1 p. 72) bis in die Hochalpen:

V Vergaldajoch am Rätikon 2500 m (S.).

I Blechnerkamm 2464 m (K. 86) und Eggessengrat 2500 m in Stubai (S. 4 p. 384); Gipfel des Glungezer 2679 m (Murr).

B Sarnerscharte 2462 m (H. 1 p. 962).

F Gipfel des Schwarzhorn 2440 m (S.).

Var. *spiculis pubescentibus* (*A. villosum* Lois.?). — A. u. G. l. c. p. 26.

V Bei Gaissau (Cust. 1 p. 78; 3; b. Rich. 2 p. 80).