

**I** Innsbruck: von Evers 1886 in Mühlau beobachtet, jedenfalls eingeschleppt (Murr 10 p. 183).

**M** Küchelberg bei Meran; Wege bei Lana (Entl. 1 IV. p. 28); zwischen Meran und Bozen (Lbd. 10 p. 659).

**E** Vahrn (Heimerl 2 p. 453), Brixen: am Pfaffensteig hinter dem neuen Friedhof an einer grasigen Stelle (Bachl 2 p. 18).

**B** Bozen, häufig (Zucc. 1 p. 265; C. H. Schultz 1 p. 604), am Kalkofen und an der Haslachallee, dann bei Sigmundskron am Etschdamme gegen den Aufschneiderhof etc. (H. 1 p. 957, Hb. F.), im Talfergerölle (Grimus 1 p. 16), Südseite des Calvarienberges (Pfaff); Leifers (Hsm. Hb. F.); Eppan in Gemüsegärten sehr häufig (Hb. Hb. F.; b. H. 1 p. 957); Neumarkt (Kot. Hb.); eine Spielart mit bläulich-grünem Kraute 1846 in einem Weinberge bei Gries (H. 1 p. 958).

**T** Trient: am Kalisberg bei 208–232 m (Kot. Hb.), an der Bahnlinie beim Palazzo delle Albere (Murr 114 p. 42); an Feldrändern bei Onea nächst Borgo (Ambr. b. C. & A. Per. 4 p. 469 und danach b. H. 1 p. 1503).

**R** Auf Aeckern bei Riva (Porta b. Kn. 4<sup>a</sup> Nr. 70<sup>a</sup>, 4<sup>b</sup> VI. p. 24); Rovereto (Crist. Hb. F.; b. H. 1 p. 957; Crist. 1 p. 339 als *Digitaria sanguinalis*), bei der Eisenbahnstation (Hepp. Hb. F.).

3. (157.) **P. humifusum** (Rich.) Kunth, *Digitaria humifusa* Rich. (1805), *Panicum lineare* Kroker (1787) non L., *Digitaria linearis* Crépin, *D. filiformis* Koeler (1802), *Panicum filiforme* Garcke non L., *P. glabrum* Gaud. (1811). — A. u. G. l. c. p. 66.

Auf Sand- und Schotterboden, an steinigen Plätzen, Acker- rändern, Wegen, Mauern, auf Flußgeschiebe.

**V** „In kalten Gebirgsgegenden häufig“ (Saut. 11 p. 17); Bregenz: auf Feldern am Siechenhof (Saut. 43), Bregenz (Bruhin b. Rich. 2 p. 80).

**O** Grins, Zams (Murr); Fließ (Hellw.); in einer Sandgrube bei Silz 1839 (Stotter & Hb. 1 p. 100; Hb. 51, Hb. F.; b. H. 1 p. 958).

**I** Bei Oberperfuß (Murr 88 p. 24); Innsbruck: in auffallend üppigen Exemplaren sehr zahlreich am Wege ober Mühlau gegen die Weiherburg (Murr 7 p. 87), bei Götzens (Kot. Hb.), an einem Wege bei Amras gegen die Innauen (Murr 2 p. 390), Lans (Kot. Hb.); Hall: zwischen Pflastersteinen vor dem Franziskanerkloster (Murr 7 p. 87). Ist sicher einheimisch und breitet sich immer stärker aus (Murr 10 p. 184 und in litt.).

**U** Rattenberg auf Sandboden (Längst b. H. 1 p. 1503); Kufstein gegen Thierberg (Murr); Kaltenbach im Zillertale (Kot. Hb.).

**K** Kitzbühel: auf Sandboden bei 1100 m (Saut. 7 p. 479; Ung. 8 p. 274), am Sonnberg (Trst. Hb. F.; b. H. 1 p. 958).

**M** An einem Waldwege südlich von Unterlana (Pfaff), zwischen Lana und Nals (Lad.).

**E** Brixen: nur einmal bei der Villa Plabach (Heimerl 2 p. 453).

?**D** Schobergruppe — ob in Tirol? (Weinl. 1 p. 57).

**B** Ritten: selten und einzig am östlichen Ufer des Wolfgruber Sees (H. 1 p. 958); Schlerengebiet: bei Gaslid an Wegen (VL. Hb. F.), Völs (Kot. Hb.); Gummer im Eggentale (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 36); Bozen: bei Ceslar (Kot. Hb.), in Menge im Talferbette von St. Antoni bis hinter Ried (Hsm. 1 p. 958; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 36 — wo