

Frangart bis Tramin (H. 1 p. 963; 20. Hb. F.; Giovanelli l. c.; Sabr. 2 p. 148, 151; Pfaff); Auer (H. 1 p. 963); Kalditsch; Salurn (H. 20).

**G** Auf Aeckern bei Tione und an Wegrändern in Breguzzo (Bonì b. H. 1 p. 963); am Steige von Bondone nach Val Vestino (Hut. b. H. 20), Val Vestino gegen Moërna (Fech. b. Amb. 4 I. p. 18).

**T** Deutschmetz (Murr); Trient, an Aeckern und Wegen (Vieh. b. H. 1 p. 1503); Cadinè (Ambr. 3 p. 401; 4 I. p. 18), Doss di Vela (VL. Hb. F.), Mattarello (Hfl. Hb. F.); Montagnaga in Pinè (Murr); an der Valsuganabahn bei Pergine (Murr 67 p. 23); selten in Unter-Valsugana (Ambr. 4 I. p. 18).

**R** Arco (Dietl.; Murr), auf Aeckern in Val di Ledro (Porta Hb. F.); Rovereto: auf Aeckern gemein (Hepp.; G. Cob. 1 p. 72).

2. (177.) *A. pratensis* L. — A. u. G. l. c. p. 131.

**V** „Hier nur gesät oder verwildert, wie überhaupt in den Gebirgsthälern“ (Saut. 11 p. 19); Bregenz selten (Saut. 43; b. H. 1 p. 963); selten im Kleinen Walsertal (Berchtold 1 p. 16; b. Rich. 1 p. 84).

**O** Prutz: auf etwas feuchten Wiesen, an wenigen Stellen, doch zahlreich (Hellw.).

**I** Innsbruck: sehr sparsam, auch eine var. *compositus* (Murr 10 p. 214), auf Wiesen bei der städtischen Schwimmschule und im abgeschlossenen Teile des Hofgartens, überall fast sicher ausgesät (Murr in litt.), Bahndämme bei Arzl (DT.); Steinach (F. Saut. b. Murr 10 p. 214).

**M** Meran (Eschenl. b. H. 1 p. 963; Anonym 83 p. 377); Wiesen bei Lana (Entl. 1 IV. p. 28).

**E** Sterzing: an einem Wiesenzaune bei Schloß Thumberg, selten (Fischn. Hb.).

**D** Abfaltersbach, nicht gar häufig (Sinner Hb. F.); Lienz: auf Feldern (Rschf. 3), Lienz (Scheitz b. H. 1 p. 963, Hb. F.; Keil 6 p. 71), auf Talwiesen im Bereiche der Schober- (Weinl. 1 p. 62) und Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 157).

**B** Ritten: hat sich auf einem Graspflanzen an meinem Hause in Klobenstein vor 18 Jahren angesät, seither daselbst erhalten und vermehrt (H. 20); Bozen sehr selten (H. 1 p. 963), in meinem Weingute am Talfertor (H. Hb. F.), Bozen (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 17).

**T** Levico (Broso).

**R** „Ex viciniis d'Arco a Facchinio“ (Bertol. 2 III. p. 575); Ambr. 4 I. p. 17 schreibt jedoch: „Giudicando sull'Erbario Facchiniano, non apparisce che la pianta in esame sia stata raccolta nelle vicinanze di Arco dal Dott. Facchini, come si ha in Bertoloni, Flora Italica III. p. 375. Egli invece la raccolse a Bolzano, e forse anche a Tremen nella ghiaja del rivo. Nessuno de' nostri Botanici la rinvenne nel Trentino“.

3. (178.) *A. geniculatus* L. — A. u. G. l. c. p. 136.

**V** Bregenz: an Riedgräben ober Hard (Saut. 43; b. H. 1 p. 963); Feldkirch: in Reichenfeld bei Tisis (Boetzkes b. Rich. 1 p. 84; 2 p. 81).

**I** Pettnau (J. Zimm. b. H. 1 p. 1503); Zirl (Murr Kot. Hb.); Innsbruck: im Innkiese beim Pulverturm (Kot. Hb.), auf dem Saggen an