

den Wassergräben (Schpf. 1 p. 19), Gräben am Amrasersee (J. Zimm. Hb. Univ.), Amras (Murr).

**U** Gräben am Achensee (Zimm. Hb. F.).

**K** Kitzbühel: an sumpfigen Stellen der Trattalpe (Ung. 8 p. 275).

**E** Brixen: an feuchten Stellen bei Naz (Bachl. 1 p. 84).

**P** St. Veit in Prags (Fech. b. Ambr. 3 p. 401; siehe Ambr. 4 I. p. 19).

**D** Talwiesen im Bereiche des Kreuzkofelgebietes (Keil 8 p. 157).

**N** Sumpf am Lago Verdè bei Cles (Loss Hb. F.).

**B** Villandereralpe, in einem Tümpel bei 1900 m (H. 20); Ritten: sehr selten unter *A. fulvus* am östlichen Rande des Wolfsgruber Sees (H. 1 p. 963, Hb. F.), daselbst eine Mittelform zwischen diesen Arten (H. Hb. F., sec. Hackel).

? **F** Fleims (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 18)\*).

? **T** Trient (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 575); in Gräben bei den Seen von Pinè; zwischen Trient und Mattarello (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 18)\*).

**R** Rovereto: da und dort auf überschwemmtem Boden der Niederungen (G. Cob. 1 p. 72).

4. (179.) *A. fulvus* Sm. — A. u. G. l. c. p. 137.

An Sümpfen und Gräben.

**V** Zwischen Gaissau und Höchst (Cust. 3), an Riedgräben oberhalb Hard (Saut. 43; b. H. 1 p. 963); Feldkirch: in den Rieden bei Tosters und Tisis (Hasler b. Rich. 1 p. 84), Leviser Weiher (Ohnes. ibid.).

**O** Von Prutz talabwärts (Brügg. b. Killias 2 p. 194); Oetztal: zwischen Umhausen und Längenfeld (K. 86), bei Längenfeld (S.), Sölden (Tpp.).

**I** Oberpettnau, nur diese Art (Murr); Innsbruck: Völs (Hofm. Hb. Gymn.), Wilten gegen den Huflhof mit *Ranunculus sardous* (Hfl. b. H. 1 p. 963, Hb. F.), Amras (Kot. Hb.), Egerdacherau (Hfl. b. H. 1 p. 963; Zimm. Hb. F.), Vill (DT. Hb. Gymn.; S.), Lanser Torfmoor (Grembl. Hb.), Lans, Windeck (Murr); Hall (Kot. Hb.); Stubai bei Neustift (K. b. S. 4 p. 384; Kot. Hb.).

**U** Am Innufer bei Kropfsberg (Gebh. b. H. 1 p. 963, Hb. F.).

**K** Kitzbühel, auf nassen Wiesen (Trst. b. H. 1 p. 963, Hb. F.).

**M** Im Laasermoose (Tpp. b. H. 1 p. 963, Hb. F.); Meran (Eschenl. ibid.); Passerufer, Altwasser der Etsch (Entl. 1 IV. p. 28), Alpenwiesen bei Platzer (Lad.).

**E** Sterzing: an feuchten sandigen Orten in Auen (Schm. 1 p. 44), Sterzingermoos gemein (Fischn. Hb.); Brixen (Hofm. b. H. 1 p. 963, Hb. F.); Kachlerau, nasse Wiesen beim Schießstande, unter dem Kofler in der Mahr (Bachl. 1 p. 84).

**P** Am Antholzermoos (Hell b. H. 1 p. 963, Hb. F.); St. Veit in Prags (Fech. b. Ambr. 3 p. 401), Neuprags (Schönach Hb.).

\*) Diese Angaben sind zweifelhaft, weil Bertoloni und Ambrosi l. c. *A. fulvus* als Synonym zu *A. geniculatus* ziehen: einigen Anhaltspunkt bietet nur Facchini's Flora von Südtirol p. 6, wo *A. fulvus* für „in montanis et subalpinis“ angegeben wird.