

V Bei der Ruine Jagdberg und anderswo mit *Ph. pratense* (Bruhin 4 p. 216).

O Imst 710 m (Kot. Hb.).

I Innsbruck: Klammeck 1470 m (Kot. Hb.), Wiesen ober der Weiherburg (Murr 11 p. 239; 47 p. 81 u. in litt.), Silltal bei 1322 m (Kot. Hb.).

P Bruneck (Schönach 2 p. 20).

D Lienz (Rschf. 3).

B Ritten: auf trockenen Triften hie und da (H. 1 p. 965), Ackerrand am Ameiser (H. Hb. F.).

G Bei Cologna di Creto 500—600 m (Porta).

T Povo bei Trient (Murr 104 p. 145).

R Monte Baldo im Gebiete von Brentonico (Poll. 1 p. 110); *P. pratense*, wie Hausmann 1 p. 965 sagt, wird jedoch weder hier noch in 3 I. p. 79 für diesen Standort angegeben.

3. (182.) *Ph. alpinum* L. — A. u. G. l. c. p. 144.

Auf Wiesen und Triften der voralpinen und alpinen Region gemein, besonders an vom Vieh gedüngten Stellen, um Hütten, Heuschober und an Bachufern.

Tiefste beobachtete Standorte:

V Brand bei Bludenz 1030 m (C. J. Mayer).

O St. Anton am Arlberg 1330 m (S.).

I Karwendeltal 1100 m (S.); Sellrain 1250 m (Kot. Hb.); Ranalt in Stubai 1300 m (S. 4 p. 384); Wattental 1300 m (S.).

U Sattel zwischen Achenkirch und Steinberg 1100 m (K. 86); Zillertal: oberhalb Brunnhaus bei Finkenberg, ca. 1300 m (Floerke 3 p. 143).

K Kitzbühel 1300 m (Ung. 8 p. 275), 1264—2200 m (Trst. Hb. F.).

B Rittneralpe „beginnt bei 4000' [1264 m]“ (H. Hb. F.).

Obere Grenze ungefähr bei 2500 m, doch liegen hierüber nur sehr spärliche Notizen vor.

4. (183.) *Ph. commutatum* Gaud. — A. u. G. l. c. p. 145.

O Fimberjoch (Brügg. b. Killias 2 p. 196).

I Auf Wiesen bei der Absamer Kirche 600 m, hier offenbar mit alpinen Sämereien eingeführt (Murr fide Hackel).

M Höhe des Scarljoches bei Taufers (Brügg. b. Killias 2 p. 196).

— *Ph. echinatum* Host. — A. u. G. l. c. p. 145.

„Der Standort auf dem Monte Baldo in Verona (Poll. Ver. I. 80, Bert. I. 352) ist nach Parl. I. 78 zweifelhaft“ (Neilr. 2 p. 30). — An den genannten Stellen ist aber gar nicht vom Monte Baldo, sondern vom Monte Bolca (bei Vicenza) die Rede!

5. (184.) *Ph. phleoides* (L.) Simonkai, *Phalaris phleoides* L., *Phleum Boehmeri* Wibel (1799), *Ph. phalaroides* Koeler (1802). — A. u. G. l. c. p. 147.

Auf Wiesen, Triften, Aeckern, Dämmen, Rainen.

O Fließ (Hellw.); Laudeck bei Ladis (V. Ebner 1866 in Hb. K.); Telfs: nahe unterhalb Buchen (Hellw.); Oetztal: bei Tumpen 950 m (Kot. Hb.).