

Pleißspitze ober der Arzler Alpe (K. 86); häufig auf den Kalkalpen um Trins 16—2200 m (K. 86, Hb.; b. S. 4 p. 384; S. Hb. F.); Obernberg (V. Ebner in Hb. K.); Kasern in Schmirn (Hfl. 51).

**U** Achental (K. 9 p. 236); Juifen, Hochplatte, Sattel zwischen Achenkirch und Steinberg bis 1100 m herab (K. 86); Sonwendjoch: Alpe Kreuzlein (Längst b. H. 1 p. 1503), Maurizalpe (K. 86); Kaisergebirge 13—1900 m (Gschwentner 2 p. 81; Hofer 1 p. 35), Teufelwurzgarten (Saut. 7 p. 463); auf den Alpen im Zillertale (Floerke b. Hoppe 12 p. 239).

**K** Auf Wiesen der Voralpen 13—1600 m mit Kalkboden, Kaisergebirge, Lämmerbühel u. s. w. (Ung. 8 p. 275), Kaisergebirge südlich am Kopfbörl (Saut. 7 p. 464), Griesalpe (Trst. b. H. 1 p. 964, Hb. F.), Lämmerbühel (Saut. 4 p. 32), Tristkogel 16—1900 m (Trst. Hb. F.; Waldm. 1 p. 323); ?Geisstein (R. & J. Hinterh. 1 p. 237).

**E** Brenner, feuchte Wiesen 1400 m (F. Saut.; Kot. Hb.), Wolfendorn (K. 86), Platzerberg bei Gossensaß 2100 m (Hut. Hb. F.); auf Alpen in Schalders (Bachl. 1 p. 84), Königsanger (Woerl 1 p. 24); Afers (Kleb. 1 p. 64).

**P** „Hier und da auf Alpen“ (Hut. 6 p. 56).

**D** Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 563), Groderalpe und Palberg in Kals (Fech. 5 p. 6; b. Ambr. 4 I. p. 21); Schleinitzer- und Leibnigeralpe (Rschf. 3; b. H. 1 p. 964), Marenwalderalpe und [jedenfalls herabgeschwemmt] in der Bürgerau bei Lienz (Rschf. 2 p. 157); Pirkacher Bergwiesen gegen die Zabrotalpe (Außerd. b. H. 20). Hieher: Tirol (Haenke 1 [1788] p. 91).

**N** Mendel (DT.).

**B** Schlern (Sendtn. b. Hfl. 35 p. 104).

**F** Alpe Neve di Primiero (Fech. 5 p. 6; b. Bertol. 2 X. p. 451; b. Ambr. 4 I. p. 21).

**R** Dossi und Finonchio bei Serrada (R. Cob. 5 p. 36; 8 p. 28); Monte Baldo: oberhalb San Giacomo (Fech. 5 p. 6; b. Ambr. 4 I. p. 21).

Var. *smaragdinum* Ambr., Fl. Tirol. merid. I. (1854) p. 21.

**D** Auf Wiesen am Palberg in Kals mit der Art (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 21).

Var. *trigynum* (Host) Schrad., *Phalaris trigyna* Host, Gram. IV. (1809) p. 12, *Pheum trigynum* Schrad. b. Mert. et Koch, Deutschl. Fl. I. (1823) p. 496, *Phleum Michellii*  $\beta$  *trigynum* Löhr, Enum. fl. Deutschl. (1852) p. 741, *Phleum Hostii* „Hort. vind.“ b. Roem. et Schult., Syst. veg. II. (1817) p. 409, Host, Fl. austr. II. (1827) p. 82, *Chilochloa cuspidata* Pal.-Beauv., Agrostogr. (1812) p. 37, *Phleum cuspidatum* Willd., Enum. Suppl. (1813) p. 5, *Chilochloa Michellii* var. *cuspidata* Rchb., Icon. I. (1834) p. 64, *Phleum Michellii*  $\beta$  *cuspidatum* Maly, Enum. (1848) p. 25, *Ph. Boehmeri* b. *cuspidatum* Richter, Pl. europ. I. (1890) p. 36. — A. u. G. l. c. p. 151.

„In Tyroli calidiori“ (Host 2 IV. p. 12 und danach in den übrigen Floren: Rchb. 4 p. 32 etc.).

7. (186.) *Ph. paniculatum* Huds. (1762), *Ph. viride* All. (1885). *Ph. asperum* Jacq. (1786), Vill. (1787). — A. u. G. l. c. p. 152.

An trockenen Abhängen, Hügeln, Mauern, auf Aeckern, in Weinbergen.