

Var. *prorepens* Koch, *A. stolonifera* γ *prorepens* Koch, *A. stolonifera* γ *flagellare* Neir. — *A. u. G. l. c.* p. 175.

P Taufers (H. 20): an feuchten, sandigen Stellen bei Luttach 11—1200 m (Treffer Hb. F.).

B Bozen: im Eisaksande (H. 20); Deutschnoven (Ambr. 4 I. p. 53).

F Primör: gegen Canal Sant Bovo und bei Santa Giuliana (Ambr. 4 I. p. 53).

Var. *patula* (Gaud.), *A. patula* Gaud. (1828), *A. stolonifera* γ *alpestris* Hsm., *Fl. v. Tir.* p. 1505 (1854), *A. stolonifera* var. *alpina* Brugg. (1888). — *A. u. G. l. c.* p. 176.

V „Sehr häufig, vorzüglich in der Alpenregion, des Freschen, wo sie viel größer und durch die dunkle Purpur-Bläue der Panikel die Augen auf sich zieht“ (Cust. 1 p. 79 als „*A. alba* γ *minor*, *decumbens floribus purpurascens*“; 2 p. 383 als *A. alba* β Mert. & Koch. *Deutschl. Fl. I.* (1828) p. 510); Ofenpaß (Brugg. b. Killias 2 p. 196 als var. *alpina*). Hieher gehört sicher die Angabe von var. *prorepens*: Drei Schwestern, Arlberg (Kemp 1 p. 125).

U Achenal (K. 9 p. 236).

M Scarljoch (Brugg. b. Killias 2 p. 196 als var. *alpina*).

P Taufers: feuchte Triften in Weißenbach 12—1800 m (Treffer Hb. F.).

D Teischnitz in Kals und Marenwalderalpe (Rschf. 3 als *A. pauciflora* Schrad.); Sexten 1900 m (Hut. in Hb. K.).

B Rittnerhorn (F. Saut. 5 p. 352 als var. *pauciflora* Schrad. = *patula* Gaud.); Grödneralpe (H. 1 p. 1505, Hb. F.); Seiseralpe (VL. Hb. F.); Ufer des Karersees (F. Saut. wie oben).

Forma *fluitans* Schröt., *A. alba* var. *flagellaris* Neir. f. *fluitans* Schroet. in *Schrift. Ver. Gesch. Bodensee XXXI.* (1902) p. 49.

V Bodensee: am Ostufer des Rohrspitz, auf der sandigen Grenzzone, vom Sand überschüttet und sich wieder herausarbeitend (Schröt. & Kirchn. 1 II. p. 49).

Var. *angustata* Ambr., *Fl. Tir. merid. I.* (1854) p. 53.

Panicula oblongo-ovalis utrinque angustata.

F Fassa: beim Badehause in Pozza (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 53).

Monstr. *vivipara* Rehb., *A. stolonifera* var. *vivipara* Rehb., Koch. *Syn. ed. 1* p. 781 etc.: „occurrit in stata luxuriante *vivipara*“, *A. vulgaris* s. *corolla post anthesim elongata* Poll., *Fl. veron. I.* p. 73. — *A. u. G. l. c.* p. 176.

V Vorarlberg (Bruhin 7 p. 128): Bodenseeriedwiesen, sandige Ufer des Rheins (Cust. Hb. nach Bruhin 3 p. 53).

?**R** Vor vielen Jahren in wenigen Exemplaren am Monte Baldo gesammelt (Goir. 16 p. 21).

— „*A. pumila* L.“, *A. alba* s. *pumila* Kunth, *A. polymorpha* var. *pumila* Ambr., *Fl. Tir. merid. I.* (1854) p. 434. — *A. u. G. l. c.* p. 176.

T Valsugana (Montini b. Ambr. 4 I. p. 434), sind von einem Brandpilze deformierte Exemplare; siehe *Magn. 23* p. 37.