

Var. *pulchella* (Saut.), *C. pulchella* Saut. in Flora XIII. (1830) p. 290 non Blytt, *C. villosa* var. *brachytricha* Torges. — A. u. G. l. c. p. 204.

K Kitzbühel: an den Felsen im Geschöß (Saut. 5 p. 290; 7 p. 468; b. Rehb. 4 p. 26; b. Ung. 8 p. 274; Trst. b. H. 1 p. 971, Hb. F.) und am Griesalpjoch (Trst. Hb. F.).

M Laasertal (Tpp. Hb. F. [gleichzeitig var. *subgeniculata*]; b. Torges 4 p. 83).

E Brixen (Haußkn. b. Torges 4 p. 83).

D Kals (Haußkn. b. Torges 4 p. 83).

Var. *nutans* (Saut.), *C. nutans* Saut. in Flora XIII. (1830) p. 289, *C. villosa* var. *hypacrathera* Torges. — A. u. G. l. c. p. 204.

K Kitzbühel: im Sintersbachergraben neben der Sintersbacher Alpe (Saut. 5 p. 289; 7 p. 467; b. Rehb. 4 p. 27; Trst. b. H. 1 p. 971, Hb. F.).

E Am Abstiege von dem Joche ober Spiluck nach Franzensfeste (Heimerl 2 p. 454, det. Hackel).

4. (198.) *C. varia* (Schrad.) Host, *Arundo varia* Schrad. (1806), *Deyeuxia varia* Kunth, *Calamagrostis silvatica* Host (1809), *Arundo montana* Gaud. (1811), *Calamagrostis montana* DC. et auct. non Host, *C. alpestris* Kern. in Hb., b. Sarntb. in Mitth. Deutsch. u. Oesterr. Alpenver. IX. (1883) p. 48 sine descr. — A. u. G. l. c. p. 208.

In Gebüschern aller Art, von den immergrünen Eichen am Gardasee bis in die Legföhren der Alpen, in lichten Wäldern, besonders Föhrenwäldern, auf Heideboden zwischen Wachholder, auf überwachsenem Gerölle, lehmigen Abhängen und Flußgeschieben, an sonnigen Felsabhängen, besonders auf Kalk.

V Im Rhein- und Illgebiet zerstreut bis ins Tal (Rich. 2 p. 81); „in omnibus nostris sylvis et nemoribus etiam in regionem alpinam adscendens ubi multo minor“ (Cust. 1 p. 80); in der Hugelregion bei Bregenz (Saut. 11 p. 17; 43; *C. varia*; Dohel 1 p. 18) und gemein in den Gebirgstälern: *C. silvatica* Host (Saut. 11 p. 17); Alberschwende auf Sandstein (Sendtn. 3 p. 319); Hohe Kugel (Cust. b. H. 1 p. 971); Illgebiet: hin und wieder bis in die Alpen (Kemp 1 p. 125), Ardetzenberg (Aichinger 2 p. 291), Frastanz (Cust. 3); Ratikon (Hasler 1). — Der Standort: Freschen (Saut. b. H. 1 p. 971) wird von Saut. 43 für „*C. acutiflora*“ angegeben.

L Lechtal: Almajurtal (S.), Höhenbachtal bei Holzgau (Zimm. Hb. F.); Stuißenfall bei Reutte (Kink b. H. 1 p. 971).

O Kalkalpen bei Imst (Ebner in Hb. K.); Finstermünz (K. 86), Nauders (Tpp. b. H. 1 p. 971); Oetzthal: Schrankogel (Harg. 1 p. 439), Heiligkreuz 1650 m (K. 86).

I Häufig im ganzen Bereiche der nördlichen Kalkalpen bis in die Talregion bei Innsbruck 650 m herab: Weiherburg (Hf. Hb. F.), Spitzbühel (K. 86), südlich des Inn: Vols gegen Omes (Handel 4 p. 292 als *C. varia* und *C. villosa*; briefl.), Silkkies in Pradl, Berg Isel (Hf. b. H. 1 p. 971), Paschberg (K. 86); an den Abhängen des Schönberges gegen die Sill eine var. *brachytricha* Torges in Hb. F. (Hf. Hb. F. u. b. H. 1 p. 972 als *C. montana*); verbreitet in den Kalkgebieten der Stubaier Gebirgsgruppe, bis 1900 m: Series (K. 86); auf