

**O** Obladis: Schönjöchl gegen Fiss (Mik 3 p. 74); Nauders (Freyn 5 p. 315).

**I** Stubai: Anger bei der Schlickeralpe: Gschnitztal: auf Wiesen bei Trius 1200 m (K. Hb.). Nach Hallier 1 p. 190 am Patscherkofel, was jedoch schon mit Rücksicht auf die Gebirgsart nicht wahrscheinlich ist.

? **U** In der Alpenregion der Achentaler Gebirge (K. 9 p. 242, doch liegen weder Notizen noch ein Exemplar vor). „Auf Zillerthaler-Alpen. Mielichhofer“ (R. & J. Hinterh. 1 1. Aufl. p. 241, 327, 2. Aufl. p. 222).

? **M** Sulden und am Fuße des Ortler (Giovaneli b. H. 1 p. 987, ohne Beleg).

**E** Afers: selten auf Alpenwiesen in Gunggan (Kleb. 1 p. 64).

**P** Prags: Fuß des Monte Sella di Sennes hinter dem Prager See, am Aufstiege zur Gufidanalpe hinter Altprags. Aufstieg zum Sarlkofel, überall nur in einzelnen Rasen (H. 20). Sarlkofel (Bornm.), Dürrenstein an Felsen 19–2000 m (Hut. 5 p. 339; 6 p. 58, in Hb. K.; Arzt 2 p. 63); Geierwände bei Schluderbach (Bornm.), auf Dolomitgeröll im Val Fonda bei Schluderbach 15–1650 m:  $\beta$  (Kn. 4<sup>a</sup> Nr. 442, 4<sup>b</sup> IX. p. 189, loc. class. von *f. tirolensis*, jedoch bereits auf italienischem Boden!).

**D** Innervillgraten: auf der Kalkader in Kalkstein (Hut. b. H. 20); Kals auf Kalk (Hinterh. & Hut. 1 p. 564, Hut. b. H. 20; Willk. 2 (2. Aufl.) p. 218); Schobergruppe (Weinl. 1 p. 64); Hochgruben bei Innichen:  $\beta$  (Murr); Sexten: Fischeleintal, Bachern, Altenstein 19–2200 m (Hut. 6 p. 58; b. Aschers. & Gr. 1 II. 1. p. 268 als *T. Carpathicum*; b. Hackel 8 p. 107, in Hb. F., Hb. K.), zwischen Sexten und dem Kreuzberg (Fech. b. H. 1 p. 987; b. Ambr. 4 I. p. 89), in Sexten besonders  $\beta$  stark verbreitet (Hackel in litt.); Kerschbaumeralpe (Hoppe 28 p. 643; 31 p. 678; Fech. 5 p. 8; b. Ambr. 4 I. p. 282; Hut. b. H. 20; Gand. in Hb. K.; F. Saut. Hb. F.; [das „Rschf.“ b. H. 1 p. 987 ist irrig und gehört zu *A. distichophylla*]); Kalkalpen über Niederdorf, oberste Waldregion am Schoberkopf 16–1900 m (Außerd. b. H. 20). Exemplare Außerdorfers vom letzteren Standorte, kommen sehr nahe der typischen Form, die Exemplare von der Kerschbaumeralpe sind schon mehr der *f. \beta* zuzurechnen (Hackel in litt.).

**N** Monte Tonale (Rod. & Ven. 2 p. 14).

**B** Gröden: an der Grenze gegen Enneberg (Fech. 5 p. 8; b. Ambr. 3 p. 403; 4 I. p. 89). Puezalpe, Tschislesalpe (Pfaff); Schlern (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 612; b. Ambr. 4 I. p. 89; VL. Hb. F.); Grasleintal (Pfaff); die nicht belegte Angabe: „Rittneralpe nach Hinterhuber“ (H. 1 p. 987) ist wohl zu streichen.

**F** Fassa (Fech. b. Ambr. 3 p. 403; 4 I. p. 89); Pala di San Martino, Vette di Feltre (Ambr. 4 I. p. 88).

**G** Cima del Frate (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 88), Val Daone (Porta nach Hackel in litt.: die typische Pflanze; Gelmi 10 p. 184); Gavarina; Cingolrosso (Fech. 5 p. 8; b. Ambr. 1. c.), Tremalso, Tombèa (Hut. b. H. 20).

[**T** Lanzola di Sella bei Borgo (Ambr. 3 p. 403; b. C. & A. Per. 4 p. 472; wird jedoch von Ambr. 4 I. p. 89 als sehr zweifelhaft hingestellt.]

? **R** Seanupia (Ambr. 3 p. 403), nach Ambr. 4 I. p. 89 ebenfalls sehr zweifelhaft. — Val di Ledro (Gelmi 10 p. 184, bezieht sich jedoch