

(F. Saut.; K. Hb.); Saxalpenwand (S. 2 p. 51) und Kraxentrag am Brenner (K. 86; Grembl. Hb.).

**U** Rofanspitze am Sonwendjoch (Längst b. H. 20; K. 86 u. Hb.); Zillertal (Unterrainer Hb. F.).

**K** Am Geisstein bei 22—2300 m (Ung. 8 p. 275; Trst. b. H. 1 p. 989, Hb. F.; Waldm. 1 p. 331<sup>bis</sup>).

**M** Schlinig ober der Wand, Kalk (Tpp. 1; b. H. 1 p. 989); Stifserjoch (Funck 3 p. 492; Schramm 2 p. 89), Franzeshöhe (Peyr. b. DT. 9 p. 84); Sulden (Fleischer b. Hochst. 1 p. 86), Schaubachhütte 26—2700 m (Buchner), Joch gegen Martell (Lorentz 3 p. 2); Laasertal (Tpp. b. H. 1 p. 989; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 92); Eisjöchl, Sprons-Lazins (Lbd. 10 p. 663, 662).

**E** Brenner (Fech. 5 p. 8; b. Ambr. 4 I. p. 92), Landshuter Hütte (S.), Wolfendorn bis zum Gipfel 2775 m (Peyr. 3; b. DT. 9 p. 84), Landshuter Weg (Eigner), Schlüsseljöchl 2230 m (K. 86), Hühnerspiel bis 2720 m (K. 86, Hb.; Peyr. l. c.); Wildkreuzspitze in Pfitsch (K. 86); Plose: sparsam an der Stelle, wo der Weg die Abstürze zwischen Plosehütte und Schönjöchl durchkreuzt (Heimerl 2 p. 454), im Gebiete gegen Afers, im oberen Kamrilltale (Kleb. 1 p. 64).

**P** Gsies (Hut. 6 p. 58).

**D** Kalkstein in Innervillgraten (Hut. 6 p. 58); Deferegen: unter dem Ferner an der Röthspitze am Joche gegen Kasern (Fech. b. H. 1 p. 989; b. Ambr. 4 I. p. 92); Venediger (R. & J. Hinterh. 1 p. 242), Prägraten und Virgen 19—2340 m (Außerd. Hb. F.), Dorferalpe (Hut. 2 p. 31<sup>k</sup>), Bergerkofel (Gand.; Kell 1 p. 13, 40); Marenwalderalpe (Reiner & Hohenwart 1 p. 32; Rschf. 2 p. 137; Wulf. 4 p. 113); Kals: Teischnitz (Scheitz b. H. 1 p. 989), Bretterspitze (Hut. Hb. F.), Stüdlhütte (Schönach Hb.), Bergerthörl (Fech. b. Ambr. 3 p. 403; 4 I. p. 92); Hofalpe, Gößnitz (Scheitz b. H. 1 p. 989); Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 161).

**N** Monte Tonale (Rota 1 p. 93; Ball 1 (1869) p. 459; Sard. 3 p. 78, Hb.; Gelmi 10 p. 184).

**B** Villandereralpe, Sarnerscharte (H. 1 p. 989; Bachl. 1 p. 86); Schlern (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 576; Fech. 5 p. 8; b. Ambr. 3 p. 403; H. 1 p. 989, Hb. F.; Spieker 1 p. 375; Osterm. 1 p. 155), Tierseralpl; Reiterjoch (Lbd. 8 p. 453, 456).

**F** Fassa: Camerloi, Padon Fassano und italiano, Monzoni (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 576; b. H. 1 p. 989; b. Ambr. 3 p. 403; 4 I. p. 92), Costa Fenil; Fleims: Lusia (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 92).

**G** Val Rendena (Gambillo 1 p. 121); Monte Pìsgana am Adamello (Rota 1 p. 93).

**T** Montalone (Paterno b. Ambr. 3 p. 403; 4 I. p. 92).

Mit (einfarbig) goldgelber Rispe in Tirol (H. 1 p. 989), jedenfalls nur vereinzelt (Murr 49 p. 141).

— **T. Cavanillesii** Trinius (1830), *Avena Cavanillesii* Koch (1837), *A. neglecta* Bertol., Fl. ital. I. (1833) p. 713, *Trisetum Gaudinianum* Boiss. (1845), *Avena valesiaca* Nyman (1855), *A. Loefflingiana* Cavanilles (1791) non L. — A. u. G. l. c. p. 272.

Hieher gehört nach Sprengel, Syst. veg. I. (1825) p. 133 und Rehb., Fl. exc. p. 50 (1830) *Arundo pygmaea* Sprengel in Mém. Acad. St.-Petersbourg II. (1811) p. 299, Pugill. pl. min. cogn. I. (1813) p. 9, Poll. in Giorn. fisico-