

med. ital. IX. (1816) p. 2, Sep. p. 22, Fl. veron. I. (1822) p. 87 tab. I (maia), welche von Erzherzog Johann und Gebhard am Monte Baldo gesammelt wurde, während Ambrosi, Fl. Tir. merid. I. (1854) p. 92 und Facchini in Zeitschr. Ferdinandeum III. Folge 5. Heft (1855) p. 92 dieselbe für *T. spicatum* hielten. Auch Prof. E. Hackel hatte bereits in Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) p. 211, ohne die citierte Stelle in Sprengel, Syst. veg. zu kennen, auf die wahrscheinliche Identität von *Arundo pygmaea* mit *T. Cavanillesii* hingewiesen und schrieb uns jetzt (1905) hierüber folgendes: „Corollae [d. i. Deckspelze] extus pilis fasciculatis corollam aequantibus vel brevioribus valvula altera apice aristis duabus terminata, arista dorsali tertia parum torta recurva“ (Sprengel). „Diese langen Callushaare waren auch der Grund, weshalb Sprengel die Art zu *Arundo!* stellte: bei einem *Trisetum subspicatum* wäre ihm das gewiß nicht eingefallen; dazu kommt, daß Pollini das von Sprengel ihm mitgeteilte Exemplar so beschreibt: . . . aristis terminalibus paleolis duplo brevioribus, rectis, dorsali duplo longiore, recurva. Für *T. Gaudinianum* trifft das genau zu, für *T. subspicatum* nicht: niemand würde dessen Deckspelze mit ihren zwei minutiösen Seitenspitzen „triaristata“ nennen, wie Sprengel“.

66. Aira L., Nelkengras.

(Aera Aschers. incl. Deschampsia Pal-Beauv.)

1. (228.) *A. capillaris* Host, *Avena capillaris* Mert. et Koch. — A. u. G. l. c. p. 278.

An sonnigen, spärlich begrastem Hügeln.

Südtirol (Sternb. b. Host 2 IV. [1809] p. 20; 3 I. p. 116).

?M Zwischen Meran und Bozen (Lbd. 10 p. 659), eine Angabe, welche kaum zu dem bei H. 1 p. 1507 angeführten Standorte Hocheppan gehören kann. Auch von Bamberger 6 p. 608 angeführt, was sich möglicherweise auf Meran beziehen könnte.

B Bozen: einzeln am Steige, der vom Wunderhofe hinter Runkelstein über den Felsenvorsprung an der Talfer zum Fuchs im Lochhofe führt (H. 1 p. 989); Ueberetsch: beim Schlosse Hocheppan (Lbd. b. H. 1 p. 1507; siehe Lbd. 10 p. 659), gemein im ganzen Sigmundskroner Berge (H. 1 p. 989, 1507, Hb. F.; Fech. b. Ambr. 3 p. 403; 4 l. p. 94; Lbd. 14 p. 308; Vulpus 4 p. 69; 7 p. 347), in der Nähe des Steinmannhofes oberhalb Leifers (Hut. b. H. 20).

T Trient: bei Sardagna (VL. in litt. ad H.); Pergine: beim laghetto Pudra (Sard. b. Gelmi 10 p. 184, Hb.), zwischen Ischia und Tenna (Gelmi 13 p. 320; b. Kn. 4^a Nr. 23, 4^b VI. p. 87), an der Landstraße in der Nähe des Sees von Levico (Fech. b. H. 1 p. 989; b. Ambr. 4 l. p. 94, Hb. F.).

R Vallunga bei Rovereto (Murr 66 p. 196).

Var. *ambigua* (De Not.), *Aira ambigua* De Not. (1844), *A. capillaris* b) *ambigua* Aschers., *A. capillaris* β *utroque flosculo aristato* Bertol., Amoën. ital. (1819) p. 328, Fl. ital. I. (1833) p. 458. — A. u. G. l. c. p. 279.

Südtirol (Fech. 5 p. 8).

B Um Bozen die vorherrschende Form (H. 1 p. 990, Hb. F.).

T Ebenso um Trient (Murr).

2. (229) *A. caryophylla* L., *Avena caryophylla* Weber b. Wiggers. — A. u. G. l. c. p. 281.

D Bei Hopfgarten in Defereggen (Scheitz b. H. 1 p. 989, Hb. F.); ?Lienz: auf der Leibniger Alpe, bei Schloßbruck auf Felsen (Rschf. 2