

nach mündlicher Mitteilung scheint es sich doch nur um Schattenpflanzen von var. *allissima* zu handeln.

B Bozen: selten im Kühbacher Walde (H. 1 p. 980).

Var. *stolonifera* (Hsm.), *A. stolonifera* Hsm., Fl. v. Tir. p. 980 (1852), *A. caespitosa* B. *stolonifera* Aschers. et Gr. — A. u. G. l. c. p. 291.

B Bozen: auf sandigem Waldboden der Rodlerau (H. 1 p. 980, Hb. F.).

R Am Loppiosee (Kot. Hb.).

Monstr. *vivipara* Rehb. — A. u. G. l. c. p. 291.

I Innsbruck: Egerdach (Murr 114 p. 42).

5. (232.) *A. litoralis* (Reuter) Godet, *Deschampsia litoralis* Reuter (1832).

Monstr. *rhenana* (Gremli), *Aira rhenana* Gremli (1874), *Aira alpina* subsp. *litoralis* monstr. *Rhenana* Aschers. et Gr. — A. u. G. l. c. p. 293.

V Am sandigen Ufer des Bodensees bei Bregenz: „Pflanze bloß $\frac{1}{2}$ —1' hoch, Blätter meist zusammengefaltet, bloß 1—2" lang, Rispe nur 1—3' lang, zusammengezogen, Aehrchen doppelt so groß wie an der normalen Form, dunkelviolet und fast durchaus lebendiggebärend“ (Saut. 11 p. 11 als *A. caespitosa* β *littorea vivipara* p. 22 als *b. littoralis* Gaud.; 43 als var. *vivipara*; b. Koch 11^a ed. 1 (1837) p. 792 ed. 2 p. 914 als var. *spiculis viviparis*; b. Döll 1 (1843) p. 105. Siehe auch Bruhin 3 p. 53; 7 p. 128; Aschers. & Gr. 1 II. 1. p. 293). *A. caespitosa b. littoralis* Gaud., Fl. helv. I. (1828) p. 323 ist jedoch nach Döll l. c. verschieden.

67. *Sieglingia* Bernh., Sieglingie, Dreizahngras.

(*Triodia* R. Br.)

1. (233.) *S. decumbens* (L.) Bernh., *Festuca decumbens* L., *Triodia decumbens* Pal.-Beauv. — A. u. G. l. c. p. 303.

Auf trockenen Grasmatten, Wald- und Bergwiesen, auf Holzschlägen, an Wegrändern, Hügeln, Rainen, besonders in der Formation der *Nardus stricta*, bis in die Voralpen.

V Rheintal (Cust. 1 p. 82); Bregenz (Saut. 11 p. 10; b. H. 1 p. 990); Dornbirn (Winder b. Rich. 3 p. 132); in den „Stöcken“ am Aufstiege von Rankweil zum Freschen (Glanz 1 p. 87, Hb. F.); um Feldkirch nicht selten (Kemp 1 p. 125; Rich. 1 p. 84; 2 p. 82; 3 p. 132).

O Pians, Landeck (Ebner b. H. 20); Obladis (V. Ebner b. K. 86); Nauders gegen Martinsbruck (Brügg. b. Killias 2 p. 200); vorderstes Oetzthal (Kot. Hb.).

I Leutasch (Glanz b. H. 20; Hellw.), Seefeld (S. Hb. F.); Nordseite des Inntales: Kerschbuchhof (Pichler b. H. 20), ober der Hungerburg (Murr), am Salzberg und oberhalb Absam (Pichler l. c.); verbreitet auf den südlichen Mittelgebirgen zwischen Oberperfuß und dem Voldertale (Pichler l. c.; K. 86; DT.; Grembl. Hb.; S.; Murr; Kot. Hb.); Schwaz (Reis. b. H. 1 p. 1507); Sellrain: Lisens bei 16—1700 m (K. 86); Stubai: Gallhof, Mieders (K. 86; Murr b. S. 4 p. 386), Oberiß bei mindestens 1800 m; Waldrast bis 1640 m (K. 86); Gschnitztal: Pflutschwiesen ober Steinach, Trins gegen Rafeis (K. 86; S.); Oberrberg 1700 m (S.).