

Gaudinia Pal.-Beauv., Gaudinia.**G. fragilis** (L.) Pal.-Beauv., *Avena fragilis* L. — A. u. G. l. c. p. 307.

T „Presso Trento nel Tirole“ (Parlat. I. p. 528, unbekannt, auf welche Quelle hin); an der Valsuganabahn bei San Cristoforo, früher auch bei Pergine (Murr 67 p. 22; 78 p. 2), doch nur auf kurze Zeit und höchst spärlich (Murr in litt.).

69. Sesleria Scop., Seslerie, Elfengras.(incl. *Oreochloa* Link.)

1. (235.) **S. ovata** (Hoppe) Kern., *Cynosurus ovatus* Hoppe (1799), *C. microcephalus* Hoffm. (1800), *Sesleria microcephala* Lam. et DC., *S. tenella* Host (1802). — A. u. G. l. c. p. 311.

An grasigen Plätzen, auf mürbem, vegetationsreichem Gestein der höheren Alpen.

I Schiefergebirge bei Zirl über 2200 m [wo?] (Andr. Saut. 4 p. 228); Stubauer Kalkberge von 2500 m aufwärts: Serles (K. 86 u. Hb.), Kesselspitze (K. 78^a Nr. 290, 78^b I. p. 109 etc.), Riepenspitze (F. Saut. b. S. 4 p. 385), Kirchdach bis 2830 m (K. 86, Hb.; b. S. l. c.), Muttenjoch (K. 86; S. 1 p. 58), Obernberger Tribulaun (V. Ebner in Hb. K.), Hoher Lorenzen (Peyr. b. DT. 9 p. 83); östlich der Sill: Hipold im Wattentale (Handel 4 p. 293), Tarntalerköpfe (F. Saut.; K. 17 p. 330; 86, Hb.), Pentenstein (F. Saut.), Saxalpenwand im Vennatale, Griesbergtal (S. 2 n. 51, 85).

U Zillertal: Duxerferner 2300 m (K. 86), Ahornspitze 2800 m (Hibsch 1 p. 117), Zemm- und Pfitschgrund (Gebh. 1799 Hb. F.; b. H. 1 p. 977; Vierthalter 1 p. 187), Greiner (Braune 4 p. 404).

K An der Nordseite des Geisstein über 2300 m (Trst. 1 p. 61; b. Saut. 4 p. 32; b. Ung. 8 p. 276, Hb. F.; Waldm. 1 p. 324).

M Im hinteren Martelltale bei über 2500 m: in den Putzenbleisen (Tpp. b. H. 1 p. 977), am Zefallferner (Lorentz 3 p. 4) und Gramsenferner (Tpp. l. c., Hb. F.).

E Massenhaft in der Brennergegend (Kern. 43 p. 223; Murr 49 p. 140): Wolfendorn (K. Hb.; Peyr. b. DT. 9 p. 83), Landshuter Weg (Eigner), Brennerspitze (F. Saut.), Zirogenwand (K. 86, Hb.), Hühnerspiel (K. ibid.; Hut. b. Kn. 4 Nr. 29, 4^b II. p. 105), Wildkreuzspitze in Pfitsch (K. Hb.); hinteres Afers auf Kalk (Bachl. 2 p. 85; Kleb. 1 p. 64).

P Tristen- und Weißenbachtal bei Luttach (Treffer in Hb. Schönach); Kaserfeld in Antholz (Hut. 6 p. 57).

D Virgental: Dorferalpe (Hut. 2 p. 314; Vulpius 4 p. 71), Bergeralpe bei 2000 m (Kell 1 p. 9), Bergerkofel (Gand.); Deferegggen: am Uebergange vom Affentale nach Taufers ober dem See (Fech. b. H. 1 p. 977); Kals (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 106), Bretterwand (Stur 1 p. 114); Kerschbaumeralpe (Rschf. b. H. 1 p. 977; Harg. 1 p. 443; Scheitz b. H. 1 p. 977; Sendtn. b. Hfl. 35 p. 104), Kaikalpen bei Nikolsdorf viel häufiger als *S. sphaerocephala* 2050—2530 m, am Zabrot, Lavanteralpe, Hochstadt (Außerd. b. H. 20).

N Monte Tonale (Rota 1 p. 92); Rabital (Venturi b. Gelmi 10 p. 183).

B Villnöß: in der Umgebung der Franz Schlüterhütte (Osterm. 2 p. 72); Gröden: Aufstieg zu den Geisslerspitzen (Zallinger b. H. 20), auf der Alpe vor Crespeina (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 106); Seiseralpe (Zucc. 1 p. 282; C. H. Schultz 1 p. 601), Plattkofel (Zallinger b. H. 20), Schlern (Elssm. b. H. 1 p. 977; Spieker 1 p. 375; Schunck 1 p. 338).