

O Finstermünz (Tpp. 1; K. 86); Pizlat (Tpp. 1); Oetzal: am Ausgange des Tales auf Kalk (S.) und an der Engelswand vor Umhausen (K. 86; S.).

I In den Kalkgebieten des Stubaiertockes, im ganzen Silltale und häufig in den südöstlichen Tälern: Mieslkopf (Kot. Hb.), Navis (K. 86; S.), hinteres Wattental (S.), Alpe Tagetlahn in Weerberg (Grembl. Hb.), Schmirn (Hofm. b. H. 1 p. 976; S.), Vennatal (Peyr. b. DT. 9 p. 83).

U Zillertal: Hinterdux (K. 86), Hochstegen (S.), Floite (K. 54 p. 148; 86).

M Malslerheide (Tpp. 1; b. H. 1 p. 976; K. 86); Graun und Churburg (Tpp. b. H. 1 p. 976, Hb. F.); Stilsferjoch auf Kalk (K. 54 p. 146; 86; Peyr. b. DT. 9 p. 83); Schloß Neu-Brandis bei Lana (Entl. 1 IV. p. 29), Gargazon (Lad.).

E Am Bergrücken östlich des Brenners und durch ganz Pfitsch (Hfl. b. H. 1 p. 976; K. 86; Peyr. b. DT. 9 p. 83) bis auf den Gipfel des Hühnerspiel 2751 m (Murr); Sterzing (Schm. 1 p. 44; Fischn. Hb.); Brixen: am Wege nach Schalder, am Eisak und an der Rienz (Bachl. 1 p. 85), auch an der Plöse auf Schiefer (Kleb. 1 p. 65).

D Virgen (Gand.): Bergeralpe auf Kalk (Kell 1 p. 8, 38); Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 563).

N Val di Sole (Ambr. 4 I. p. 104); Cima Nalbiol am Tonale (VL. Hb. F.).

B Gemein auf Porphyrtuff um Bozen und Neumarkt (Elssm. 1 p. 509; H. 1 p. 976, Hb. F.; Lbd. 14 p. 308; K. 86; F. Saut. 6 p. 11; Pfaff), doch auf Porphyrtuff nur bis 1200 m, während auf Kalk bis wenigstens 1900 m (H. 20).

Zuerst von Wulfen in Prag gefunden (Wulf. 4 p. 104).

Var. *albicans* (Kit.), *S. albicans* Kit. (1814), *S. coerulea* var. *flavescens* G. F. W. Meyer (1849), *S. caerulea* var. *flava* Doubl.-Verz. schles. bot. Tauschver. 1880/81 p. 2, *S. coerulea* var. *alba* Wiesbaur in Deutsch. bot. Monatsschr. I. (1883) p. 99. — A. u. G. I. c. p. 318.

Aehrchen gelblichweiß.

V Mondspitze am Rätikon (E. Winder b. Rich. 5 p. 340; f. „albieda“).

I Leutasch: in Brandt, sehr selten (Hellw.); Hohe Warte (Kot. Hb. als „var. pallescens“); Innsbruck (S. Hb. F.); unter dem Planötzenhof (Murr 1 p. 14; 9 p. 72; 44 p. 120; 49 p. 140).

B Schlern (Hellw. b. Murr 62 p. 116); Bozen: einmal bei Runkelstein (H. 1 p. 976, Hb. F.).

F Fassa (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 579).

T Pallone am Monte Bondone (Gelmi 15 p. 76).

R Scanupia (Gelmi 10 p. 183).

Var. *pseudelongata* Murr in Deutsch. bot. Monatsschr. XVII. (1899) p. 103, die Form, mit verlängerter, unterbrochener, öfter auch bleicherer Inflorescenz, nach Aschers. in litt. ad Murr (66 p. 195) „völlig identisch mit seiner var. *Ratzeburgii*“ Aschers. et Gr., Syn. II. 1 p. 319 (1900), jedoch nach Murr in litt. (1905) damit doch nicht zu identifizieren.

I Innsbruck: vereinzelt beim Planötzenhof und am Haller Salzberg (Murr 66 p. 195–196).