

so fehlen Notizen aus **O** Oetztal, **I** Sellrain, **P** dem Tauferertale, **D** Virgen und Deferegggen; eigentümlicherweise liegen auch trotz des vorhandenen Kalkes keine Beobachtungen aus dem Ortlerstocke vor.

Höchste beobachtete Standorte:

O Jamtal bei Galtür [da letzteres schon 1537 m hoch gelegen, mindestens bei 16–1700 m] (Lenz 2 p. 333).

I Schnitztal: auf Kalkgerölle an der Hohen Burg bei ca. 1600 m; hinterstes Obernberg, am Joche gegen Pfersch 1750 m (S.).

U Hinterdux, mindestens 1500 m (Längst b. H. 20).

E Brenner gegen das Hühnerspiel 1470 m (K. 86).

P Ampezzo: gegen Falzarego 1500 m (S.).

B Seiseralpe [mindestens 1600 m] (VL. Hb. F.).

G Val Genova 1400 m (S.).

Nach unten im nördlichen Gebiete häufig bis zum Bodensee und Kufstein gehend, dagegen in den Talniederungen von Brixen und Meran abwärts nur sporadisch in der var. β (siehe diese), um dann hier im südlichsten Tirol: **R** Arco (Dietr.), Riva (Hepp.), zwischen Nago und Mori (Wettst.), Hügelregion um Rovereto (G. Cob. 1 p. 74) wieder allgemeiner aufzutreten.

Var. *minor* Gaud., Fl. helv. I (1828) p. 216 („*dodrantalis sesquipedalis*“), für **V** Bodenseeried (Cust. 1 p. 83), Lorenzen (Schlenker 5 p. 183) und Walsertal (Bruhin 4 p. 216) erwähnt, bezieht sich offenbar nur auf die typische Pflanze, im Gegensatz zur var. *major* (β *arundinacea*).

Var. *viridiflora* Lejeune (1824), *M. coerulea* var. *flavida* Murr in Deutsch. bot. Monatsschr. XV. (1897) p. 142. — A. u. G. I. c. p. 337.

I Innsbruck: am Lansersee (Murr 9 p. 73; 49 p. 142).

Var. *arundinacea* (Schrank), *Molinia arundinacea* Schrank (1789), *M. coerulea* b. *arundinacea* Aschers., *M. coerulea* β *major* Koch etc. („*varietas maior*“ Koch, Syn. ed. 1. [1837] p. 808 etc.). — A. u. G. I. c. p. 337.

V Bregenz: „am Hacken“ (Saut. 11 p. 28 ohne die Form zu benennen; 43 als var. *littoralis*; b. H. 1 p. 1002); Dornbirn (Winder b. Zimmerm. 1 p. 6; b. Rich. 2 p. 82); im Illgebiet nicht selten (Kemp 1 p. 154; Hasler b. Rich. I. c.).

I Leutasch: Bergkamm, Hohe Munde bis 1500 m (Hellw.); Innsbruck: Kranebitterklamm (Schm. b. H. 1 p. 1002, Schm., Hfl. Hb. F.; Murr 8 p. 163), auf Waldboden ober der Weiherburg, namentlich an den Felshöhlen dortselbst (Murr 2 p. 390 u. I. c.), Natters (Kot. Hb.), am Ausflusse des Amraser Sees (Hfl. b. H. 1 p. 1002, Hb. F.), Lans (Hfl. Hb. F.); Georgenberg bei Schwaz (Schm. b. H. 1 p. 1002, Hb. F.).

U Häufig in Bergwäldern bei Rattenberg (Längst b. H. 20).

M Meran: bei Videgg am Ifiger (Viehw. b. H. 1 p. 1002).

B Bozen: am Wege außer dem Köhler Brunnl (H. 1 p. 1002, Hb. F.; F. Saut. 6 p. 10, Hb. F. als *M. altissima* Link); Ueberetsch: im Moose bei Frangart (H. 1 p. 1002, Hb. F.), in Buchenwäldern am