

p. 187); Borgo: Hügel bei Levale (Ambr. b. H. 1 p. 1002, Hb. F.), felsige Orte am Ciolino [ca. 500 m] (Ambr. 4 I. p. 139), in der Umgebung von Grigno (Ambr. 4 I. p. 139).

R Arco (K. 86; Diettr.); häufig um Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 1002, Hb. F.; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 139; G. Cob. 1 p. 74); von Rovereto bis Ala (K. 86); im Gebiete von Brentonico (Poll. 1 p. 109).

74. *Melica* L., Perlgras.

1. (244.) *M. transsilvanica* Schur, *M. ciliata* B. transsilvanica Hackel. — A. u. G. l. c. p. 344.

E Brixen (Schm. Hb. F. det. Hackel).

N Mechel bei Cles (Loss Hb. F. det. Hackel).

2. (245.) *M. nebrodensis* Parlat. (1845), *M. ciliata* var. *nebrodensis* Cosson, *M. ciliata* L. p. max. p., *M. glauca* F. Schultz (1862), *M. ciliata* l) *glauca* Richter. — A. u. G. l. c. p. 345.

An warmen, felsigen Bergabhängen, überwachsenen Geröllhalden, in Gestrüppe der Straßenränder, an Mauern, Schloßruinen. **V** Häufig im Rheintale und Illgebiete (Rich. 2 p. 82); Hohenems (Cust. 1 p. 81; b. Gaud. 1 p. 448; Saut. 11 p. 9 etc.); Feldkirch (Rehst. b. H. 1 p. 1507; Kemp 1 p. 125; Hasler 1; Rich. 1 p. 84; 2 p. 82); Vaduz (Hasler 1); Hängender Stein bei Nüziders (Bruhin 14 p. 304).

O Eine Charakterpflanze des Oberinntales zwischen Pfunds 967 m und Landeck, bis Pians 852 m (Glanz 1 p. 88, Hb. F.) und Kaltenbrunn 1261 m (Hellw.); von Landeck abwärts nur sporadisch: Imst (Ebner Hb. K.; Glanz 1 p. 88; Hellw.), zwischen Wenna und Arzl (C. J. Mayer), Eingang des Oetztales (Kot. Hb.), Oetz (K. 86 etc.), Engelswand ca. 1000 m (K. 86), Locherboden bei Mötztal (Murr 37 p. 45); gegenüber Stams (Murr; Calvarienberg bei Telfs (Murr 88 p. 54).

I Stubai: an den geröllreichen Lehnen hinter Neustift 1000–1050 m (K. b. S. 4 p. 386).

M Ueber die ganze Malsertal bis 1500 m (K. 86) und von da abwärts durch das Etschtal (Tpp. 1; b. H. 1 p. 991; Lbd. 10 p. 659; Vulpus 4 p. 67; Uechtr. b. Entl. 1 IV. p. 29; Milde 11 p. 190; 13 p. 434; K. 86; Pfaff).

E Gossensaß gegen Pontigl (Murr 81 p. 125; 113 p. 2); Sterzing: gegen Flains (Schm. 1 p. 45), am Eingange des Pfischertales (Hfl. b. H. 1 p. 991, Hb. F.; Fischn. 2 p. 46); bei Mittewald (C. J. Mayer); Brixen (Hofm. b. H. 1 p. 991, Hb. F.; Bachl. 1 p. 86; Murr).

P Taufers: am Schloßberge 1100 m (Treffer Hb. F.); Bruneck (H. 20; Schönach 2 p. 21; S.); Ampezzo (Hut. 6 p. 58).

D Um Lienz (Scheitz b. H. 1 p. 991, Hb. F.; Keil 8 p. 163; F. Saut. Hb. F.).

N Castel Brughier bei Tajo (Hfl. b. H. 1 p. 991).

B Gemein; im Sarntale bis 1100 m: Schloß Reineck und hinter Sefen gegen Windlahn (S.); am Ritten bis 1200 m (H. 1 p. 991); Kastelruth, Seis, Ratzes bis ca. 1100 m (C. H. Schultz 1 p. 604; Milde 29 p. 6; H. 20 etc.). Mit honiggelben Aehrchen oberhalb St. Pauls in Eppan (Hellw. b. Murr 65 p. 116).

F Fleims: um Cavalese bis etwa 950 m (S.), Ziano (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 578); doch kaum in Fassa, wie Ambr. 4 I. p. 100 angibt.