

N Fondo, Mendel (DT.); Cles (Loss Hb. F.).

B Garnstein, Villanders auf Schiefer (S.); Ritten, auf Wiesen, Klobenstein am Wege nach Kematen: ad *K. montanum vergens* (H. Hb. F. als *K. cristata*); Gröden: Ferrara-Alpe bei 18—1900 m (K. Müll. 3 p. 293), Seiseralpe auf Dolomithblöcken: γ (H. 20), Tschapith an der Seiseralpe, ca. 1600 m (Lbd. 8 p. 437), am Schlern bis 1940 m mit β (Kot. Hb.); Latemar 1800 m (Bornm.); gemein um Bozen (Eschenl. 1; H. Hb. b. H. 1 p. 978, Hb. F.; K. Hb.; F. Saut. 6 p. 12), daselbst *foliis hirsutis et ciliatis* (F. Saut. 5 p. 352); im Eisakbette unter dem Kalkofen: β (H. 1 p. 978, Hb. F. als *K. cristata* β major), bei Kampill, ebenfalls β (Pfaff).

F Häufig in Fassa, Fleims und Primör (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 576; Paol. 1 p. 7, 14; S.).

G Im Sarccatale häufig, auf Kalk bis Campiglio 1500 m (S.), bei Tione (Bonh. Hb. F.); für das Chiesegebiet nicht angegeben.

T Gemein; Trient: steinige Plätze im Eichenniederwalde zwischen Maso Catturani und Masi d'Aria; eine Schattenform mit kleinen Aehrchen (VL. Hb. F.); Borgo auf Hügeln: β und γ (Ambr. Hb. F.), auf grasigen Hügeln in Valsugana: „*K. cristata* b. *panicula elongata, gracili, glumis paleaque inferiore apicem versus prope marginem villosa-ciliatis*“ (Ambr. b. Parlat. 1 I. p. 524).

R Gemein; bis zum Gardasee herab (Lbd. b. H. 1 p. 1506; K. 86; S.); Rovereto auf Bergwiesen (Crist. Hb. F.).

2. (249.) *K. montana* (Hsm.), *K. cristata* var. γ *montana* Hsm., Fl. v. Tirol p. 978 (1852), *K. montana* DT., Anleitg. Beob. Alpenpfl. (1882) p. 341, Domin in Allg. bot. Zeitschr. IX. (1903) p. 41, non Aschers. et Gr., Syn. II. 1 p. 358 (1900). — A. u. G. l. c. p. 358; Domin l. c. p. 257.

O Alpe Verpail bei Prutz (Schranz b. H. 20).

P Bei Luttach 10—1400 m (Treffer b. Domin 2 p. 258); Altprags (H. 20); im Geröll und Kies der Bäche bei Toblach, Höhlenstein und Schluderbach (Bornm. 2 p. 43 und in litt.).

D Virgen (Gand.); Kals, Lärchenwälder, Voralpentriften 1500 m mit teilweise an den Rändern zerstreut wimperigen Blättern (Freyn b. Domin 2 p. 258); Sexten 11—1400 m (Treffer b. Domin 2 p. 258); ? Lienz (Scheitz Hb. F. als *K. cristata*, doch Exemplar nicht sicher bestimmbar).

N Monte Peller bei Cles 1800 m (Loss Hb. F.), Monte Cles 9—1100 m (Handel 4 p. 293).

B Am Ritten von 1260 m aufwärts z. B. gegen Kematen und von da bis etwa 1770 m der Rittneralpe (H. 1 p. 978; Exemplare liegen jedoch nicht vor; die vorhandenen Exemplare von „*Koeleria cristata*“ vom Ritten zeigen *K. ciliata ad montanam vergens*); Waidbruck, an der Kastelruther Straße (Junge 1 p. 21); Petersberg (Pfaff); Joch Grimm (Gelmi 12 p. 236; 13 p. 320).

T Monte Gazza, Monte Bondone (Gelmi 3 p. 36; 10 p. 183), Dosso dei Loresi am Bondone (Sard. Hb.).

3. (250.) *K. eriostachya* Pančić. — A. u. G. l. c. p. 365; Domin l. c. p. 260.

„Probabiliter in Tirolia“ (Domin 2 p. 261).