

haft (K. Hb.), Amras (Benz Hb. F.); Hall, zwischen Pflastersteinen vor dem Franziskanerkloster mit *Panicum humifusum* (Murr 7 p. 87; 10 p. 183, Hb. F.); Schwaz, höchst selten (Reis. b. H. 1 p. 1507).

M Um Meran sehr gemein (Hfl. b. H. 1 p. 993; Bamb. Hb. F.; Wallis 1 p. 24; K. 86; Hallier 1 p. 207; Entl. 1 IV. p. 30; Dürer 1 p. 160).

E Brixen: bei der Haltestelle Vahrn, bei der Ergänzungsbezirks-Kaserne und in der Rapp-Anlage (Heimerl 2 p. 455), bei Krakoff (Außerd. b. H. 20), an Rainen und Hügeln bei Tschötsch (Hofm. b. H. 1 p. 993, Hb. F.; Bachl. 1 p. 86; Woerl 1 p. 24).

D Lienz: an sonnigen Stellen 750 m (F. Saut. Hb. F.).

B Verbreitet im Eisak- und Etschtale (Zucc. 1 p. 265; Elssm. 1 p. 507; Harg. 1 p. 442; Link 1 p. 219; C. H. Schultz 1 p. 604; H. 1 p. 993; 20; Spieker 1 p. 380; Freiseisen Hb. F.; F. Saut. Hb. F.; Grimus 1 p. 15, 25, 27; Dürer 1 p. 153; Zschacke 2 p. 123; Pfaff), im Sarntale bis hinter dem Sarnerzoll 440 m (S.); am Ritten noch an der Siffianerkirche 1020 m und beim Hausmann'schen Hause in Klobenstein 1180 m, an beiden Orten nur zwergig, dann am Pflaster des Weges zwischen St. Ottilia und dem Kölblhofe bei 1075 m (H. 20).

G Judicarien (Ambr. 4 I. p. 129).

T Gemein in der Umgebung von Trient und in Valsugana (Poll. 3 I. p. 105; Fech. b. Bertol. 2 III. p. 582; Ambr. 4 I. p. 129; b. H. 1 p. 993; C. & A. Per. 4 p. 473; Sard. Hb.; Kot. Hb.).

R Riva (Sonklar 3 p. 278; Gelmi 10 p. 185); Rovereto gemein (Ambr. 4 I. p. 129; Hepp.; G. Cob. 1 p. 73).

77. *Dactylis* L., Knäuelgras.

1. (257.) **D. glomerata** L. — A. u. G. l. c. p. 378.

Auf trocken Wiesen, Grasplätzen, an Rainen, Wegen, lichten Waldplätzen etc. Gemein bis in die Voralpenregion:

L Almajurjoch 1800 m (S.).

O Zwischen Vent und Heiligkreuz 1700 m (K. 86).

I Gramai-Joch gegen die Hinterriß 1800 m (S.); Pfandleralpe in Stubai 1580 m (K. b. S. 4 p. 386); Obernbergersee 1600 m (K. 86).

P Falzarego-Joch gegen Cortina 1800 m (S.).

B Rittneralpe bei Pemmern 1600 m (H. 20); Seiseralpe (Lbd. 8 p. 437), noch auf Wiesen bei der Mahlknechtsschwaig [ca. 2000 m], hier *spicis purpurascens* (VL. Hb. F.).

T Voralpen des Bondone, ebenfalls dunkler gefärbt (VL. Hb. F.).

Eine „forma culmo elato strictissimo, panicula interrupta“.

M Meran: am Etschufer bei Marling (Uechtr. b. Entl. 1 IV. p. 100).

Var. **Reichenbachii** Hsm. in Mscr. 1878 sec. Huter in sched., *D. glomerata* β *ciliata* Hsm. in sched. 1876 non (?) Peterm., Fl. lips. (1838) p. 80, siehe Aschers. et Gr., Syn. II. 1. p. 379 (1900). Hiemit wohl auch identisch *D. rigida* Hsm. in sched. non Boiss., siehe General-Doubl.-Verz. schles. Tauschver. 1880—1881 p. ?, Nyman, Consp. Suppl. II. 2. (1890) p. 336, Aschers. & Gr. l. c. — A. u. G. l. c. p. 379.