

**T** Trient: Campo trentino (Gelmi 3 p. 37), an Gräben zwischen der Fersina und Mattarello (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 120); Caldonazzo-See (Kot. Hb.).

**R** Rovereto (Hepp.).

Die Innsbrucker Pflanze wurde wie die von Trient von Hackel als echt erklärt; doch sind beide Pflanzen wenigstens habituell, außerordentlich verschieden und ist der Formenkreis dieser Art nach Hackel in litt. noch völlig ungeklärt (Murr in litt.).

12. (269.) *P. intermedia* (Ambr.), *P. alpina* = *intermedia* Ambr., Fl. Tir. merid. I. (1854) p. 115, *P. sclerocalamos* Fech. in sched., *P. alpina* × *caesia*?, vergl. Aschers. et Gr., Syn. II. 1. p. 419 (1900). — A. u. G. l. c. p. 419.

**F** Fassa: auf dem Joche zwischen Durontal und Camerloi im Val Donna am Rosengarten (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 115; b. Gelmi 10 p. 186. von Letzterem jedoch nicht gesehen).

13. (270.) *P. compressa* L. — A. u. G. l. c. p. 419.

Auf dünnen Grasböden, trockenen steinigen Hügeln und Rainen, auf Sand und Gerölle an Mauern, Weg- und Straßenrändern.

**V** Rheintal (Cust. 1 p. 84); Bregenz, gemein (Saut. 43; b. H. 1 p. 1000; Bruhin b. Rich. 2 p. 82); Dornbirn (Winder b. Zimmerm. 1 p. 6; b. Rich. 1. c.); Feldkirch (Hasler b. Rich. 1 p. 84; 2 p. 82).

**O** Zams (Kot. Hb.); Obladis: im Walde gegen die Asterhöfe (Mik 3 p. 74).

**I** Innsbruck: am Nordgehänge bis zur Arzleralpe 1070 m (K. 86), Völs (Kot. Hb.), im Sillgries bei Pradl (Hfl. Hb. F.), an Straßenmauern beim Berg Isel (Hfl. b. H. 1 p. 1000, Hb. F.), südliches Mittelgebirge (Benz Hb. F.; Zimm. Hb. F.; Kot. Hb.), sandige Gehänge an der alten Schönbergstraße (Murr b. S. 4 p. 386; Steinach (F. Saut.).

**M** Meran (Jeggle b. H. 20), Schloß Tirol (Fech. b. Bertol. 2 V. p. 602), Algund, Küchelberg (Uechtr. b. Entl. 1 IV. p. 100).

**E** Brennerstraße oberhalb Gossensaß (Hepp. b. H. 1 p. 1508), Sterzing: im Gerölle des Valler-, Pfitscher- und Mareiterbaches (Fischn. Hb.); Brixen (Hofm. b. H. 1 p. 1000; Bachl. 1 p. 87).

**P** Niederdorf, in der Au auf dem Geschiebe der Rienz (H. 20).

**D** Oberhalb Nikolsdorf bei 950 m (Außerd. b. H. 20).

**N** Cles (Loss Hb. F.), Denno (Hfl. Hb. F.).

**B** Ritten: an Rainen und Mauern bei Kleinstein und Unterinn, einzeln am Kemater Wege bis 1260 m (H. 1 p. 1000, Hb. F.), höchstes Vorkommen am Wege bei Pfaffstall und einzeln bei Pemmern [1570 m] (H. 20); Bozen: gemein z. B. an der Talfer und am Eisak (H. 1 p. 1000, 1508, hier als  $\beta$  Langeana (Rchb.), Hb. F.); Pigenö bei Eppan (Hfl. b. H. 1 p. 1000).

**F** Primör: um Fiera 700 m, Agnerola-Alpe bei 1400 m (Paol. 1 p. 7, 21).

**T** Mezolombardo (Kot. Hb.); häufig um Trient (Per. b. H. 1 p. 1000; VL. Hb. F.; Sard. Hb.; Kot. Hb.); Valsugana, in Weinbergen (Ambr. b. Bertol. 2 X. p. 460).

**R** Arco (Diettr.), Riva (Lbd. b. H. 1 p. 1508); Rovereto, gemein, im äußeren Vallarsa (Crist. 1 p. 341; b. H. 1 p. 1000, Hb. F.; Hepp.: K. 86; G. Cob. 1 p. 73).