

Var. *anceps* Gaud. — A. u. G. l. c. p. 429.

I Innsbruck: Wiltener Felder an Ackerrainen (Murr 11 p. 240, nach einer Bestimmung Hackels).

Var. *angustifolia* Sm. — A. u. G. l. c. p. 431.

Besonders auf Kies und Gerölle.

V Feldkirch (Schönach 2 p. 21).

O Oetztal (Kot. Hb.).

I Innsbruck: im Kiese des Inn und der Sill (Hfl.; Schm. b. H. 1 p. 999, Hb. F.), Lanserkopf (Hfl. 51, Hb. F.); Stefansbrücke auf Sandboden, Medratz in Stubai (S. Hb. F.).

M Rayen, ca. 1600 m (Tpp. Hb. F. u. b. H. 1 p. 1000 als *P. pratensis*); Schlanders (Tpp. b. H. 1 p. 999); Meran: am Küchelberg (Entl. 2 p. 181, doch nicht 1 IV. p. 100).

E Sterzing; mehr an mager bewachsenen Orten der Anhöhen (Schm. 1 p. 45); Brixen (Schm. b. H. 1 p. 1508, Hb. F.).

P Mühlwald 1260 m (Außerd. in Hb. K.); Bruneck (Marchesani b. H. 20).

D Virgen, an warmen Abhängen (Gand.).

B Rittneralpe auf der Schön, ca. 1650 m, an dünnen Stellen (H. 20); Seiseralpe bei der Saltariahütte, ca. 1650 m (VL. Hb. F.); Bozen: häufig im Talferbette und am Schloßfels von Runkelstein (H. 1 p. 999, Hb. F.), Bozen (Ambr. 4 I. p. 124).

F Fassa (Ambr. 4 I. p. 124).

G Tione, an Hügeln (Boni b. H. 1 p. 999, Hb. F.).

T Trient: oberhalb Sardagna (Sard. Hb.), Piazzina, Kalisberg, Fontana Santa, Doss Trento; Costalta in Pinè (VL. Hb. F.); Valsugana (Ambr. 4 I. p. 124), ?Settelaghi (C. & A. Per. 4 p. 473 als *P. angustifolia* L.).

R Rovereto (Ambr. 4 I. p. 124).

18. (275.) *P. violacea* Bell. (1792), Hackel, Monogr. Festuc. eur. (1882) p. 200, *Festuca poaeformis* Host (1802), *F. rhaetica* Sut. (1802), *F. pilosa* Hall. fil. (1802), Koch. — A. u. G. l. c. p. 434.

O Nauders (Uechtr. 6 p. 249); Oetztal (K. Hb.), bei Vent (Tpp. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.).

I Morgenkopf am Glungezer 1940—2000 m (Kot. Hb.); Trunajoch (Benz fide Oborny).

M Alpen bei Mals (Hofm. b. H. 1 p. 1008), in Schlinig ober den Almen auf Glimmerschiefer (Tpp. ibid., Hb. F.); in Sulden (Fleischer b. Hochst. 1 p. 86); Spronseralpen, sehr häufig (Bamb. 4 p. 663; b. H. 1 p. 1508, Hb. F.).

E Platzerberg bei Gossensaß 2300 m (Hut. Hb. F.); Jaufen 1800 m an steinigen Plätzen (Hut. b. K. 78^a Nr. 1088, 78^b III. p. 148).

P Weitfeld bei Luttach 20—2200 m (Treffer; Murr 115 p. 72), Mühlwaldtal bei 15—1900 m (Außerd. in Hb. F., Hb. K.); Sarkkofel in Prags (Bornm.).

D Kals (Rschf. 3 als *F. poaeformis*; b. H. 1 p. 1008), daselbst an Felsen und auf Alpenmähdern bei Lesach, am Lesacher Wiesenberg, Tschamp 13—2200 m (Hut. b. H. 20, Hb. F.). In Kals offenbar schon