

Var. *minor* Hackel (1878). *F. violacea* var. 1 *genuina* subvar. β *carnica* Hackel (1882). — Hackel l. c. p. 133; A. u. G. l. c. p. 491.
K Alpen um Kitzbühel (Trst. Hb. F. als *F. violacea* Gaud.).

17. (297.) *F. picta* (Kit.), *F. picta* Kit. — Hackel l. c. p. 134; A. u. G. l. c. p. 492.
K Thoralpe bei Kitzbühel (Trst. in Hb. Maly als *F. nigrescens* Lam.: Hayek 7 p. 218).

18. (298.) *F. nigricans* Schleich., *F. nigrescens* Gaud. (1811) non Lam. — Hackel l. c. p. 135; A. u. G. l. c. p. 492.

V Hochkrumbach (S. Hb. F., det. Hackel); die Standorte: Mittagspitze (Saut. 11 p. 23; 43; b. H. 1 p. 1007) und Freschen (Cust. 1 p. 83; 3 u. b. H. l. c.) dürften eher zu *F. fallax* gehören; dagegen ergibt sich, wie Hackel in litt. mitteilte, aus dem Zusammenhange, daß folgende Angabe wahrscheinlich hieherzubeziehen ist: „*Festuca colorata* H[oppe?], auf den Alpen Vorarlbergs gemein, wird 2—3 Schuh hoch. Die Wurzelblätter lang, borstlich, die Rispe vielblütiger als bei *nigrescens* La M., die Blüten größer und länger gegrannt, und ist wohl nur eine Alpenform von *F. rubra*“ (Saut. 11 p. 23). Der von Rich. 3 p. 132 hiehergesetzte Standort Tilisuna-Alpe (Bornm.) bezieht sich auf *F. violacea*.

I Stubai- und Gschnitztal (K. b. Hackel 4 p. 135), Pfrimes-Mäher an der Saile (Murr 37 p. 47), Alpein, Nordseite des Blaser, Trinsler Padaster 1600 m, Sondestal an der Garklerin (K. Hb.), Simming 2000 m in Massenv egetation (Handel).

K Schiefergebirge um Kitzbühel 20—2300 m, Geisstein (Trst. Hb. F. als *F. nigrescens* Lam.; b. H. 1 p. 1007 als *F. heterophylla* β *nigrescens*, nicht als *F. heterophylla*, wie Murr 37 p. 47 angibt; siehe *F. rubra*), Tristkogel und Geisstein (Saut. 4 p. 32, 36 als *F. nigricans*; 3 p. 130; 7 p. 466, 467, 480 als „*F. nigrescens* Lam.“; Braune 7 p. 616 ebenso; Waldm. 1 p. 324, 331 ebenso).

M Zirneck bei der Prader Schafalpe und massenhaft an der Stilsersjochstraße bei Franzenshöhe (K. Hb.; b. Hackel 4 p. 135).

E Zeragalpe am Brenner (Murr 37 p. 47).

N Monte Peller bei Cles (Loss Hb. F.).

T Monte Gazza (Merlo Hb. F.; b. H. 1 p. 1007 als *F. heterophylla*; von H. im Hb. F. als „*F. heterophylla nigrescens*“ bezeichnet, das Exemplar ist jedoch zweifelhaft); Alpen im Valsugana (Ambr. Hb. F.; von H. als *F. nigrescens*? bezeichnet).

19. (299.) *F. norica* Hack. — Hackel l. c. p. 135; A. u. G. l. c. p. 493.

V Hochkrumbach (S. b. Murr 88 p. 56, Hb. F.).

I Unter der Höttinger Alpe bei Innsbruck 1260 m (K. Hb.), Lafatschjoch 19—2000 m (Murr 37 p. 47); Serles, Blaser 16—2200 m; Oberberg (K. Hb.; siehe Hackel 4 p. 136).

M Naturnser Hochwart (Lad.).

E Platzerberg bei Gossensaß 2300 m (Hut. Hb. F.; Murr 37 p. 47).

P Alpentriften in Tristen, Weißenbach 20—2400 m, Raine, grasige Hügel bei Lutlach 1600 m (Treffer Hb. F.).