

M Auf Wiesen bei Meran, z. B. gegen Forst hinaus (Bamb. Hb. F.; b. H. 1 p. 1509 als *F. loliacea*).

?**E** Brixen: zerstreut am linken Ufer des Eisak dem Schießstande gegenüber (Bachl. 2 p. 19 als „*F. loliacea* Huds.“).

B Bozen: im Talferbette (H. 1 p. 1011, Hb. F. als *F. loliacea*).

24. (304.) *F. arundinacea* Schreb., *F. elatior* Sm., Engl. Bot. tab. 1593, Schrad., Roem. et Schult., Custer, Saut. Mscr., Bertol. Fl. ital. I. (1833) p. 616, Fech., non L., *F. pratensis* et *F. arundinacea* Pollini, Fl. veron. I. (1828) p. 118 et auct. pl. ital. sec. Bertol. l. c. — Hackel l. c. p. 152; A. u. G. l. c. p. 505.

V Häufig im Rhein- und Illtale (Kemp 1 p. 154; Rich. 2 p. 83); Bregenz (Saut. b. H. 1 p. 1010); Lustenau (Cust. ibid.); Feldkirch; Schellenberg, Bendern; Bludenz (Hasler 1).

I Innsbruck (Schm. b. H. 1 p. 1010, Hb. F.), Innufer am Rechen (K. Hb.), Weitaltal bei Mühlau (K. 86).

K Kitzbühel: in Auen und Bergwäldern (Trst. b. H. 1 p. 1010, Hb. F.), am Geschöß (Üng. 8 p. 277).

M Meran: am Etschufer (Entl. 1 IV. p. 101).

E Brixen: an Ufern (Hofm. b. H. 1 p. 1010, Hb. F.), zerstreut am Eisakufer, Hachl (Bachl. 1 p. 87), Plose, 1700 m (Kleb. 1 p. 65).

P „Gemein“ (Hut. 6 p. 60); Bruneck (H. 20).

D Virgen (Gand.).

B Ritten: am Kemater Wege am Bächlein unter dem Kalkofen und am Ackerraine auf dem Ameiser, am Zauberbache östlich bei Waidach (H. 1 p. 1010, Hb. F.); eine f. nana Hsm. von etwa 1 Fuß Höhe mit schön braunrot gefärbten Aehrchen und ziemlich einfacher Rispe, auch an den unteren Aesten mit nur 1—3 Aehrchen häufig am Wege unter dem Kemater Kalkofen, vorzüglich in trockenen Jahren (H. 20); Seiseralpe, Schlern, Hauensteinerwald, am Zimmerlehener Weiher bei Völs (VL. Hb. F.); Bozen: am Talferbette vor Runkelstein selten (H. 1 p. 1010, Hb. F.), Sigmundskron (Lbd. 14 p. 308), im Frangarter Weiher (Pfaff), Wiesengraben bei Haslach (H. 20).

F Fassa und Fleims innerhalb der Getreideregion (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 586 als *F. elatior*, auch von H. 1 p. 1010 hierher bezogen); zwischen San Lugano und Cavalese, auf Wiesen bei Tesero (Ambr. 4 I. p. 173); Primör: Ceredapaß 1200 m (Paol. 1 p. 12).

T Trient: am linken Etschdamme ober der Lorenzobrücke (VL. Hb. F.); Valsugana (Ambr. 4 I. p. 173); ? „in sylvis di Castellana in districtu di Civezzano“ [womit wohl nur Castellano bei Rovereto gemeint sein kann] (Fech. b. Bertol. 2 X. p. 462 als *F. elatior*).

R Val di Ledro auf Bachschotter, Kalk, 10—1300 m (Porta Hb. F.), Val di Concei (Foletto 1 p. 22), Ponalewasserfall bei Riva (K. 86), Sarcamündung (Murr); ? Monte Baldo: selve d'Avio längs des Wildbaches 130—900 m (Poll. 1 p. 114 als „*F. elatior* W. Enum., *F. arundinacea* Schreb.“, von H. 1 p. 1010 bei *F. arundinacea* und *F. elatior* eingereiht). Siehe auch **T**.

Var. *subalpina* Hackel. — Hackel l. c. p. 154; A. u. G. l. c. p. 507.

I Obenberg (V. Ebner in Hb. K. als *F. elatior*) und wohl danach Tirol (Hackel 4 p. 155).