

p. 127); Scanupia und Colsanto (Crist. 1 p. 366, 330); am italienischen Baldo (Poll. 3 I. p. 117; b. Bertol. 2 I. p. 612; Lbd. 6 p. 133). Der Standort Via Aviana gehört nicht, wie bei H. 1 p. 1009 dargestellt ist, hierher, sondern zu *F. spectabilis*.

Die Nordostgrenze dieser Art zieht von Tessin her durch Tirol über folgende, eine gewundene Linie zeigende Punkte: Cima del Frate—Gantkofel—Schlern—San Pellegrino—Buchenstein—Afers—Sterzing—Meransen—Reintal in Ahrn—Virgen—Großglockner.

28. (308.) *F. alpestris* Roem. et Schult. (1817), *F. alpina* Host (1809) non Sut. (1802), *F. flavescens* Rehb. (1834), *F. varia* β *flavescens* Koch et auct. p. p. non Bell., *F. flavescens* α et β Bertol., Fl. ital. I. (1833) p. 596. — Hackel l. c. p. 171; A. u. G. I. c. p. 516.

„In subalpinis, alpinis Tyrolis“ (Host 2 IV. p. 36 tab. 63 und danach Rehb. 4 p. 39 etc.).

P Buchenstein (Hackel 4 p. 172); Ampezzo (Hut. 6 p. 60, b. H. 20).

[**D** Die Angabe: „nördlich bis zum oberen Drautale (Huter!)“ bei Aschers. & Gr. 1 II. p. 517 bezieht sich nach Hut. in litt. wahrscheinlich auf *F. varia*.]

N Siehe **B**.

B Seiseralpe (H. 1 p. 1008), im Walde am Steig von Ratzes zur Seiseralpe (VL. Hb. F.), Schlern (H. Hb. F.; Lbd. 8 p. 441; Hackel 4 p. 172), daselbst am Schäufelesteig 16—1900 m und am Steig nach Tiers (H. Hb. F.; VL. Hb. F.), Schlern, auf der Sesselalpe 1800 m, Tschamintal 1600 m (F. Saut. 5 p. 352 als *F. Eския* Ram. = *F. varia* Koch); Gantkofel: Wände der weiten Stelle häufig (Lbd. b. H. 1 p. 1008), Mendel (Hut. in Hb. Schönach), Penegal 1600 m (F. Saut. wie oben) häufig an den östlichen Abhängen zwischen Penegal und Mendelpaß (Pfaff).

F Fassa: Padon Fassano (α), Vaël, Marmolata (β) (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 584; b. Hayek 7 p. 219); Fleims: an dünnen Abhängen zwischen Tesero und Panchiä dichte Rasen bildend (α) (Fech. b. Bertol. l. c.; b. Ambr. 4 I. p. 162, 824; b. Hayek l. c.; S.); Primör: Monte Tatöga in Canal San Bovo, monstr. vivipara Ambr., Fl. Tir. merid. I. (1854) p. 162, alla Scaletta östlich vom Brocconepaß und auf der Alpe Neva seconda (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 162, 163).

G Judicarien (Hut. b. H. 20); Formation bildend an den sterilen Granitgehängen des hinteren Val Genova ober der Bedolè-Alpe (Lorentz 3 p. 58—59 als *F. pungens*; S. 1893). Lorentz sagt l. c. hierüber: „Das Anstrengendste und Ermüdendste aber, was dem Alpenwanderer aufstoßen kann, erwartet ihn da, wo *F. pungens* Roem. et Schult. steile Hänge bekleidet. Dies Gras wird nie gemäht, auch das Vieh scheint es zu verschmähen, so wächst es in langen Büschen, die sich in der Richtung des Abhanges niederlegen und eine spiegelglatte Fläche bilden, auf der man nur mit größter Vorsicht und Anstrengung das Ausgleiten vermeidet. Auch die Steig-eisen, die sonst auf steilen Grashängen so gute Dienste thun, helfen hier Nichts, da man mit ihnen leicht in dem langen Geflechte hängen bleibt“.

T Trient: Monte Gazza oberhalb Covelo (Pfaff), Monte Vasone oberhalb Gola (Gelmi 12 p. 236), zwischen Villazzano und Vigolo; Val-sugana: Monte Rocchetta bei Borgo (Ambr. 4 I. p. 162).

R Val di Ledro (Gelmi 10 p. 188), Monte Lomar, Kalk 17—1800 m: f. *colorata* Porta in sched., Porta Hb. F.); Monte Bondone gegen