

**B** Seiseralpe und Schlern (Elssm. b. Mert. & Koch 1 III. p. V: „eine Varietät von *F. varia*“; C. H. Schultz 1 p. 601; H. 20; Osterm. 1 p. 156), Ratzes, Schlern (Lbd. 8 p. 438, 441), Tiers (H. 20); Gantkofel (Lbd. 14 p. 312; b. H. 1 p. 1007), Mendel (H. l. c.); Joch Grimm (Thaler b. H. 1 p. 1508), Zanggen in Massenvegetation (Bornm.).

**F** An trockenen Abhängen der Alpen von Fassa und Fleims (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 584), Fedajapaß gegen den Padon (Molendo 5 p. 549).

**G** Judicarien (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 161), Val Genova am Wege von Bedolè zur Mandronhütte (Pfaff), Valle di San Valentino (Boni b. C. & A. Per. 4 p. 474; b. H. 1 p. 1007, Hb. F.).

**T** Bondone: Dosso d' Abramo (Gelmi 3 p. 37); Valsugana: Sasso rotto gegen Palù, Montalone, Cima d'Asta, Joch zwischen Caoria und Val Tesino (Ambr. 4 I. p. 161).

**R** Campogrosso (Lbd. b. H. 1 p. 1007); Monte Baldo (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 161). Die Angabe: Prabazar und Ferrara am Baldo (Poll. b. H. 1 p. 1007) ist irrtümlich; siehe *F. alpestris*.

*Var. acuminata* (Gaud.), *F. acuminata* Gaud., *F. varia* subsp. *eu-varia* var. 1. *genuina* subvar. 2 *acuminata* Hackel, *F. flavescentis* Gaud. (1811) non Bell., *F. flavescentis* 2 *pumila locustis* totis e viridi aureis Bertol. Fl. Ital. III. (1837) p. 584. — Hackel l. c. p. 173; A. u. G. l. c. p. 518.

?**N** Monte Tonale (Rota 2 p. 95; Rod. & Ven. 2 p. 17 als *F. varia* b. *flavescentis*).

**B** Seiseralpe und Schlern mit der Art (Artzt 4 p. 96).

**F** Fassa: Durontal sehr selten (Fech. b. Bertol. 2 III. p. 584), Schlern gegen das Durontal (Fech. b. Hayek 7 p. 218).

*F. varia*: „in calidioribus demissis est spiculis pallidis vel flavescentibus, in alpibus ex purpureo violaceis (Fech. 5 p. 11).

Vergl. auch Murr in Deutsch. bot. Monatsschr. XV. (1897) p. 142.

30. (310.) **F. pumila** Vill. — Hackel l. c. p. 176; A. u. G. l. c. p. 522.

Auf steinigen Wiesen und an Felsen der Alpen.

**V** Häufig auf den höheren Alpen (Rich. 2 p. 83); Dornbirner Alpe (Saut. 43; b. H. 1 p. 1008); Widderstein (Köberlin 1 p. 236); Illgebiet (Kemp 1 p. 154); Rothwand, Schafberg (Rebst. b. H. 1 p. 1508), Flexen, Arlberg (Schramm 2 p. 83); Rätikon (Hasler 1), Lünersee (F. J. Winter 1 p. 387).

**O** Innsbr.: Muttekopf (Jeggle b. H. 20), Hahntennenjoch, Südseite (Murr 4 p. 88); Nauderthal (Tpp. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.).

**I** Leutasch: ziemlich verbreitet, z. B. Thörl (Hellw.); Reitherspitze (S. Hb. F.); Solstein (Hfl. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.; J. Zimm. Hb. F.; b. H. 1 p. 1007 als *F. varia*), hinter der Frauhitt (J. Zimm. Hb. F.), Höttingerberg (Zim. Hb. F.), Hafelekars (K. Hb.; Murr 44 p. 151), Rumerjoch (Gsaller 8 p. 43); Roßkogel (Hfl. 51; b. H. 1 p. 1008, Hb. F.; K. Hb.); zwischen Votscherferner und Hochgräfljoch (Handel 4 p. 293); Hoher Burgstall (K. Hb.; b. S. 4 p. 387), an vielen Punkten der Kalkgebirge zwischen Stubai und Obernberg 21—2700 m (Hfl. b. H. 1 p. 1008, Hb. F.; F. Saut. b. S. l. c.; K. 86, Hb., Hb. F.; Arn. 4 VI. p. 1116; Peyr. b. DT. 9 p. 84 etc.); Rosenjoch (VL. Hb. F.);