

Schatberg (Trst. Hb. F.), Nadelwälder am Ehrenbach 975 m (Ung. 8 p. 277).

[D Hart jenseits der Grenze: Gailtal in Buchenwäldern hinter dem Edererwirt (Auferd. b. H. 20).]

[B Seiseralpe: „Hr. Dr. Bischoff sammelte hier eine *Festuca*, die, wenn sie nicht zu *F. decidua* der Engl. Bot. gehört, eine ganz neue Art ausmacht“ (Zucc. 1 p. 282).]

F Fleims: Bosco del Gazzo bei Ziano (Fech. b. Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 169).

G In einem schattigen Walde knapp oberhalb des Arnöbach-Ursprunges (Fech. b. Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 169).

T Trient: in Wäldern an der Maranza (Gelmi 13 p. 320).

R Vallarsa: im Walde oberhalb Camposilvano (Fech. b. Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 169).

35. (315.) *F. maritima* L. (1753), *F. tenuiflora* Schrad. (1806), *Agropyrum unilaterale* Pal.-Beauv. (1812), *Triticum unilaterale* DC. (1813) non L., *Nardurus unilateralis* Boiss., *N. tenellus* Rehb. (1831). — A. u. G. I. c. p. 540.

R Rovereto: bei Madonna del Monte, forma *aristata* (Hepp. b. Hackel 2 p. 211 nach Exemplaren im Hb. H. und Hb. F. als *Festuca ciliata*).

36. (316.) *F. rigida* (L.) Kunth, *Poa rigida* L., *Scleropoa rigida* Griseb. — A. u. G. I. c. p. 545.

Südtirol ([Fech. b.] Koch 11^a ed. 2 [1844] p. 936).

B Bozen: Grieserberg, in Menge an und zwischen den Pflastersteinen am Wege nach Ceslar beim gescheibten Turm beginnend und bis etwa Hälfte Weges hinauf 400 m, in trockenen Jahren oft kaum höher als einen Zoll und dann leicht zu übersehen (H. 1 p. 1004, Hb. F.), am Wege nach Rafenstein (Seelos b. H. 1 p. 1508; 20), an Wegen bei Leifers (Lbd. b. H. 20).

T Deutschmetz (Kot. Hb.), Mezolombardo (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 176); gemein um Trient an dünnen Hügeln, an Wegen, Felsen, Gütermauern bis 500 m (Hfl. b. H. 1 p. 1004, Hb. F.; Fech. b. Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 176; b. Bertol. 2 X. p. 459; Viehw. b. H. 1 p. 1508; 20; Lbd. 6 p. 130; VL. Hb. F.); Valsugana: bei Grigno (Paterno b. Ambr. 1. c.).

R Bei Arco und Riva (C. & A. Per. 4 p. 474; Fech. b. H. 1 p. 1004; b. Ambr. 3 p. 404; 4 I. p. 176; b. Bertol. 2 X. p. 459, Hb. F.; Lbd. b. H. 1 p. 1508; K. 86; Porta b. K. 78^a Nr. 1083, 78^b III. p. 147); häufig um Rovereto (Crist. 1 p. 341; b. H. 1 p. 1004, Hb. F. Fech. b. H. 1 p. 1004; b. Bertol. 2 X. p. 459; Costa b. Ambr. 4 I. p. 176; Hepp.; G. Cob. 1 p. 74); im Gebiete von Brentonico (Poll. 1 p. 110); zwischen Ala und Avio (Lbd. 6 p. 131), im untersten Vall'Aviana (Pfaff).

37. (317.) *F. Danthonii* Aschers. et Gr., *F. ciliata* Danthoine (1805) et auct. non Link (1799), *Vulpia ciliata* Link (1827). — A. u. G. I. c. p. 550.

„In locis sterilibus provinciae Veronensis et Tyrolis magna manu provenit simul cum affini *Festuca Myuro*“ (Poll. 3 I. p. 123).