

**E** Sterzing: auf einem Acker innerhalb Gasteig (Schm. 1 p. 45); Brixen: in den Angerfeldern (Bachl 2 p. 19).

**D** Um Lienz (Rschf. b. H. 1 p. 1013; Keil 8 p. 154; Weinkl. 1 p. 56), verderbliches Unkraut im Wintergetreide bei Lengberg und Nikolsdorf (Außerd. b. H. 20).

**N** Nonsberg: San Romedio (Loss Hb. F.).

**B** Ritten: bei Klobenstein (H. 1 p. 1013), in Roggenäckern bei Pfaffstall und beim Roaß bis 1420 m (H. 20); Blumau (S. Hb. F.); selten bei Bozen, häufiger bei Siebenaich (H. 1 p. 1013); Margreid (H. 1 p. 1013, Hb. F.); Salurn (H. 20).

**F** Fassa und Fleims (Fech. b. Bertol. 2 III, p. 588).

**G** Tione (Boni b. H. 1 p. 1013, Hb. F.).

**T** Um Trient (Hfl., Per. b. H. 1 p. 1013, Hb. F.; VL. Hb. F.); Pinè; Palù; Valsugana (Ambr. 4 I. p. 182).

**R** Val di Ledro: unterhalb Molina; Calliano (Ambr. 4 I. p. 182); Rovereto, gemein (Ambr. 1. c.; Hepp.; G. Cob. 1 p. 74); Serrada (R. Cob. 7 p. 44; 8 p. 29); letzte Saatfelder ober Brentonico, auch mit violettgescheckten Aehrchen (Hfl. b. H. 1 p. 1013, Hb. F.).

14. (335.) *B. racemosus* L. — A. u. G. I. c. p. 613.

Auf Wiesen und Triften.

**V** Bodenseeried (Cust. 3; b. H. 1 p. 1012); in Obstgärten und auf Feldern um Bregenz nicht selten (Saut. 11 p. 26), am Hacken (Saut. 43).

**I** Innsbruck (Hepp. b. H. 1 p. 1509; Glanz b. H. 20); an der Eisenbahn bei der Figgen: var. *inermis* [= var. *submuticus* Celak. (1881). — A. & G. I. c. p. 614?] (Murr 6 p. 276; 10 p. 214), beide Angaben wurden jedoch von Murr in litt. als zweifelhaft erklärt; an uncultivierten Orten bei Patsch (F. Saut.).

**K** Hie und da auf Grasplätzen (Ung. 8 p. 277); Kitzbühel (Trst. b. H. 1 p. 1012).

**B** Bozen: bei Frangart und Sigmundskron mit *B. secalinus* und *B. commutatus* (H. 1 p. 1012; das im Hb. F. vorliegende Exemplar von Sigmundskron „von Koch selbst bestätigt“, ist jedoch *B. commutatus*!), zwischen Gries und Sand, bei Sigmundskron (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 180), Bozen (Sendtn. b. Hfl. 35 p. 104).

**F** Moëna (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 180); Predazzo (Fech. b. Bertol. 2 III, p. 588 u. b. Ambr. 1. c.).

**T** Valsugana: Telve gegen Pontarso (Ambr. 4 I. p. 180), Levale bei Borgo (Ambr. b. C. & A. Per. 4 p. 475 u. I. c.).

15. (336.) *B. hordeaceus* L. (1753), *B. mollis* L. (1762), *B. nanus* Weigel (1772). — A. u. G. I. c. p. 615.

Auf Wiesen, Aeckern, an Wegrändern, Rainen, Hügeln, Mauern, an sandigen öden Plätzen, Straßenböschungen.

**V** Gemein in den Haupttälern bis in die Voralpen (Cust. 1 p. 85; Saut. b. H. 1 p. 1013; Kemp 1 p. 155; Hasler 1; Zimmerm. 1 p. 147; Rich. 2 p. 83).

**L** Lechgebiet (Knittel); Reutte (S.).

**I** Gemein um Innsbruck bis 900 m (Hfl. 51, Hb. F.; b. H. 1 p. 1013; Schm. Hb. F.; K. 86; Zimm. Hb.; Peyr. b. Magn. 12 p. 41; S. etc.); Telfes (S. 4 p. 387, Hb. F.); Schwaz (Schm. b. H. 1 p. 1013).