(Tpp. b. H. 1 p. 922. Hb. F.); Eisjöchl 26—2700 m (Lbd. 10 p. 663); Spronseralpe (Fcch. locis cit.).

E Falsun am Brenner 21—2200 m (K. Hb.), Hühnerspiel (K. Hb.), hier bei 2300 m, auch häufig auf grasigen Plätzen (Murr 55 p. 147); Innerafers, kurzbegraste, felsige Triften und Kalkfelsen; am Peitler stellenweise sehr häufig (Bachl. 2 p. 17).

P Schönberg bei Luttach, Kalkschiefer 22—2400 m (Treffer Hb. F.); Sarlkofel in Prags (Hut. 6 p. 54).

D Dorferalpe in Prägraten, Bergeralpe in Virgen bis zur Spitze der Weißen Wand, Glanzerkögele oberhalb Windischmatrei, im Allgemeinen bei 1850—2700 m, stets über kalkhaltigem Boden (Hut. 2 p. 314; Kell 1 p. 9, 11, 38; Außerd. b. K. 78ᵃ Nr. 1054, 78ᵇ III. p. 139); Kals, ebenfalls über Kalkglimmerschiefer (Hinterh. & Hut. 1 p. 562), Palberg, wenig ober der Baumgrenze (Fcch. 5 p. 117; b. Ambr. 3 p. 393; 4 I. p. 277). Teischnitz, Palberg, Böses Weibele (Hut., Gand. b. H. 20), Valedischnitz (Außerd. ibid.). Südlich der Drau: Felskopf nördlich der Dreizinnenhütte (Ginzberger u. Vierhapper), Böden in Sexten (Hut. 6 p. 54); sparsam am Kanzele der Kerschbaumeralpe (Hut. u. Gand. b. H. 20).

N Monte Tonale (Rota 2 p. 88).

B Schlern, an der höchsten Spitze (Bischoff 1 p. 235; b. Hoppe 25 p. 45), Schlernkofel (H. 1 p. 922, Hb. F.), daselbst und nördlich darunter (Fcch. 5 p. 117; b. H. l. c.; b. Ambr. 4 I. p. 277), Schlern, gegen die Seiseralpe (Zucc. 1 p. 282), Schlern (Spieker 1 p. 377; Roth Hb. F. etc.), Tierseralpe, Rosengarten (Lbd. 8 p. 453, 455; Grabm. b. H. 20); Reiterjoch (Lbd. 8 p. 456); zwischen Weißenstein und Aldein (Pfaff).

F Fassa, an Felsen und auf grasigen Terrassen: Antermoja gegen Camerloi, hinteres Vajolettal (Fcch. b. Ambr. 4 I. p. 276), Monte Campedie bei Vigo 2300 m (Briquet 6 p. 484), Padon, Contrin (Fcch. b. Ambr. 3 p. 393 u. l. c.), Monzoni, unweit des laghetto delle Selle, zwischen Piz d'Aloc und Pismeda, alle Soraghe (Fcch. b. Ambr. locis cit.), Monzoni (Schunck 1 p. 338); Fleims (Fcch. 5 p. 117), Travignolotal (Eichenf. 3 p. 34).

G Brentakette (Loss 1 Nr. 129); Bocca di Brenta (Gelmi 10 p. 173; Sard. Hb.), auf welchen Standort sich jedenfalls die Stelle bei Gambillo 1 p. 120 bezieht; Montalone (Montini b. Bertol. 2 X. p. 38).

R Scanuppia, Monte Baldo (Gelmi 10 p. 173).

5. (376.) **C. pulicaris** L. — A. u. G. l. c. p. 14.

Auf Moorgründen, feuchten Wiesen.

V Bodenseeried (Cust. b. H. 1 p. 922); Bregenz, selten (Saut. 11 p. 28 u. b. H. l. c.); Feldkirch: Moorgründe des Rheintals, Galgenwiese bei Göfis (Kemp 1 p. 124).

O Bergwiesen der Zameralpe (Hellw. b. Murr 26 p. 20).

I Seefeld (K. 34 p. 366; Hellw.; Murr 20 p. 45); Flaurling (Murr l. c.); Roßkogel (K. Hb.; Murr l. c.), Grinzens (Handel 2 p. 28), Senders (K. 86), um Völs, zwischen Götzens und Mutters (Handel l. c.); oberhalb Mieders (K. Hb.), Alpein 2086 m (K. 86); bei Amras, Lans, Igls, Aldrans (Glanz, Hepp., Zimm. b. H. 1 p. 1498, Hb. F.; Ebner Hb. F.; K. Hb.; Hellw.; Murr 20 p. 45; 76 p. 154; Peyr. b. DT. 9 p. 81); Volderwald (Grembl. Hb.; Murr l. c.); Patscherkofel 1390 m;