

[U Zillertal (Schrank 1 p. 38 als „C. praecox Schrank fl. bav. Nr. 146 nec Synon. Jacquini“, und danach Braune 2<sup>II</sup> p. 636 als C. praecox Schrank.)]

**M** Gargazon (Lad.).

**B** Kollmann (Fech. 5 p. 118); Bozen: Rentsch (H. Hb. F.), Haslach im Gebüsch (Huter b. H. 1 p. 1498; H. Hb. F.).

**T** Trient: sehr häufig am Doss Trento und Alle Laste (Ambr. 3 p. 393; 4 I. p. 295; b. H. 1 p. 1498; b. Bertol. 2 X. p. 51; Viehw. b. H. 1 p. 1498 Nr. 1970<sup>a</sup> u. b.; VL. Hb. F.; Gelmi 3 p. 35; Sard. Hb.).

**R** Rovereto: Castell Predaja unterhalb Isera, gegen Mori und bei Chizzola (Fech. 5 p. 118; b. Ambr. 4 I. p. 295; Hepp.), Rovereto, häufig (G. Cob. 1 p. 70), San Pietro bei Nomi (Murr 114 p. 42).

14. (385.) *C. brizoides* L. — A. u. G. l. c. p. 33.

In Gebüsch, an Hecken, Waldrändern.

**V** Selten bei Bregenz (Saut. 11 p. 28; 43; b. H. 1 p. 927; Cust. 3; b. Doll 1 p. 137; b. H. 1 p. 927; Bruhin b. Rich. 2 p. 79).

**I** Hall (Ebner in Hb. K.), bei der Borgias-Kapelle daselbst (Murr 20 p. 46); Schwaz: in Gebüsch nächst der Kaserne (Handel 4 p. 293).

**U** Rattenberg: häufig am Stadtberg, Zimmermoos und Angerberg (Längst b. H. 1 p. 1498). In unendlicher Menge am Angerberg in den Tannenwäldern an etwas lichten Stellen und bis ins Tal herab, wo sie noch an den Eisenbahndämmen bei Kirchbichl massenhaft ist (K. Hb. u. 86); Wörgl gegen Hopfgarten, Ellmau (Roth u. Glanz b. H. 20); Kufstein: Waldränder der Vorberge des Kaiser (Hofer 1 p. 35), Wiesenhänge beim Ed-Schlößchen (C. J. Mayer), am Ebbs-Bache (Kot. Hb.); Zell im Zillertale (Gebh. b. H. 1 p. 927, Hb. F.).

**K** Kitzbühel: an Zäunen gemein (Ung. 8 p. 279), an Zäunen, Feldrändern (Trst. b. H. 1 p. 927, Hb. F.; Roth u. Glanz Hb. F.).

**T** Trient: mit *C. Schreberi* am Doss Trento (Viehw. b. H. 1 p. 1498), wozu Gelmi 3 p. 35 bemerkt: „Non più trovata, la *C. Schreberi* invece vi cresce abbondante“. Ferner gehört der Standort Borgo (Ambr. b. H. 1 p. 927), wie schon Ambr. 4 I. p. 294 bemerkt hat, nach dem bezüglichen Exemplare im Hb. F. teste Kükenthal und Kneucker zu *C. leporina* — trotz der lebhaften gegenteiligen Versicherung Hausmanns im Manuskripte.]

15. (386.) *C. vulpina* L. — A. u. G. l. c. p. 36.

Auf Sumpfwiesen, an Gräben.

**V** Häufig bis in die höheren Alpen (Rich. 2 p. 79), Bregenz, nicht häufig (Saut. 11 p. 29; 43 u. b. H. 1 p. 925); Feldkirch (Rehst. b. H. 1 p. 1498); Illgebiet: häufig bis in die höchsten Alpen, Fermental, Arlberg (Kemp 1 p. 124). Der Standort Dornbirn bei Zimmerm. 1 p. 7 gehört nach Rich. 1 p. 85 zu *C. paniculata*.

**M** Tharandsberg, Plaus, Eggerhof, Labers (Entl. 1 IV. p. 13).

**?D** Lienz: auf sumpfigen Wiesen unter Lengberg (Rschf. 3 u. b. H. 1 p. 925).

**B** Bozen: an der Straße nach Sigmundskron und rechts von Siebenaich, dann an den Gräben der Maisäcker zwischen Moritzing, Siebenaich und Sigmundskron; auch am Wassergraben an der Haslach-Allee und beim Steinmannhof (H. 1 p. 925–926, Hb. F.);