

St. Pauls; Tramin; Montau (Ambr. 4 I. p. 287), Neumarkt (Hepp. b. H. 20).

F Fassatal; Masi di Cavalese (Ambr. 4 I. p. 287; E. Bertol. 2 X. p. 64).

T Deutschmetz (Lbd. b. H. 1 p. 1498); Trient (Gelmi 10 p. 174); bei San Martino und Alle Ghiaje, doch sparsam (Murr); alla Vasina bei Borgo (Ambr. b. C. & A. Per. 4 p. 466; Ambr. 4 I. p. 287).

R Arco (Lbd. b. H. 1 p. 1498; Diettr.).

Var. *nemorosa* (Rebent.), *C. vulpina* β *nemorosa* Koch. — A. u. G. l. c. p. 37.

V Bregenz, mit der Art (Saut. 11 p. 29).

16. (387.) *C. fetida* Vill. — A. u. G. l. c. p. 37 (*C. foetida*).

M Alpen von Vinschgau (Tpp. b. H. 1 p. 926, Hb. F.); Rabbijoch (Handel 4 p. 293).

E Am Peitlerkofel (Bachl. 1 p. 81), in Gunggan am Fuße desselben 18–2400 m (Kleb. 1 p. 66).

N Monte Levi, gegenüber von Pejo i. J. 1846 (Fech. b. Ambr. 3 p. 393; 4 I. p. 284; b. Bertol. 2 X. p. 44); Alpentriften im Rabbitale (Tpp. b. H. 1 p. 925), am Saent-Ferner („Salendferner“*) im Rabbitale, am Uebergange nach Martell i. J. 1825 (Fleischer b. Hoppe 25 p. 9 und danach Host 3 II. p. 575; Rechb. 4 p. 56 etc.; Sard. Hb.), häufig am Cereenapaf an feuchten Stellen, auch gegen Osten herab 23–2600 m, auf dem Rabbijoch seltener (Handel 4 p. 293).

B Schlern (Funck 2 p. 284), daselbst auf den sumpfigen Stellen hinter der Alphütte (Eissm. 3 p. 366).

G Judicarien (Parolini b. Bertol. 2 X. p. 44); Cima Marese südlich vom Val Daone i. J. 1846 (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 285).

17. (388.) *C. contigua* Hoppe, *C. muricata*** L. p. p. und der tirolischen Autoren zum größten Teile, *C. muricata* A bei Aschers. et Gr. — A. u. G. l. c. p. 38 (39); Vollmann l. c. p. 75.

An feuchten Stellen unter Gebüsch, an Zäunen, Hecken, Rainen, Ufern, nassen felsigen Orten, auf lichten Waldplätzen, Holzschlägen.

V Sehr häufig bis in die Alpen (Cust. 1 p. 87; Saut. 11 p. 29; b. H. 1 p. 926; Kemp 1 p. 124; Hasler 1; Zimmerm. 1 p. 7; Rich. 2 p. 79).

L Bieberwier (S.).

O See in Paznaun; Landeck; Sautens, Oetz (S.).

I Verbreitet im Inntale, im Hb. F. von Inzing und mehrfach von Innsbruck (Hfl., Schm.) vertreten; südlich bis Neder (S. 4 p. 382) und oberhalb Matri 1000 m (S.). Forma *nemorosa* (Lumnitzer) (*C. nemorosa* Lumnitzer, *C. muricata* var. *interrupta* Wallr., *Schedulae* crit. I. (1822) p. 493, *C. contigua* β *interrupta* O. F. Läng in Flora XXVI. (1843) p. 144, vergl. Vollmann l. c. p. 67, 76), am Glockenhofe bei Hall (Murr 20 p. 46).

*) Bei A. Roth 1 III. p. 1271 in „Sateufelder“ corrumpiert.

**) Vergl. über diese Gruppe: Vollmann F., Der Formenkreis der *Carex muricata* und seine Verbreitung in Bayern. — Denkschr. bot. Ges. Regensburg Neue Folge II. Bd. (1903) p. 55–90. Wir verdanken auch dem Herrn Bearbeiter die Revision des einschlägigen Materials des Museum Ferdinandeum.