

T Trient: Monte Gazza (Merlo Hb. F. u. b. H. 1 p. 926 als *C. muricata*), Doss Trento (VL. Hb. F. als *C. muricata* β *interrupta*), ai Giardini mit *C. divulsa* Good. (Murr 60 p. 102 fide Kükenthal).

Var. *angustifolia* Vollmann in Denkschr. bot. Ges. Regensburg Neue Folge II. (1903) p. 74.

B Ritten: am Fenn bei Klobenstein; Bozen: am Wege vom Kalvarienberg nach Haslach (H. Hb. F. als *C. muricata* var. *virens*; 1 p. 926 als *C. muricata*).

G Bolone im Val Vestino (Porta, siehe *C. divulsa* var. *litigiosa*).

T Doss Trento (Hb. Hb. F. u. b. H. 1 p. 926 als *C. muricata*).

20. (391.) *C. divulsa* Good. (1794), *C. muricata* β *divulsa* Wahlenb., *C. virens* Lam. (1789)? — A. u. G. I. c. p. 41; Vollmann l. c. p. 77.

Wie *C. contigua*.

V Feldkirch (Stocker b. Bruhin 3 p. 52); Tisis (Kemp 1 p. 124).

I Grasplätze und Gebüsch am Fuße des Thaurer Schloßberges, hier von Rupert Junker entdeckt (Murr 2 p. 389; 20 p. 46; 21 p. 101; 103 p. 121 u. in litt.; DT. 22 p. 10; *C. virens*).

M Montani, Meran und Burgstall (Tpp. Hb. F., richtig bestimmt).

T Trient: Doss Trento (Gelmi 3 p. 35; 10 p. 174), Maso Cristellotti (VL. Hb. F. als *C. muricata* β *interrupta*), ai Giardini (Murr 60 p. 102, fide Kükenthal).

R Rovereto (Poll. 3 III. p. 65), daselbst auf Wiesen im Tale (Crist. Hb. F.; b. H. 1 p. 926, doch ist das Exemplar für eine sichere Bestimmung zu jung), Isera (Fech. 5 p. 118; b. Ambr. 3 p. 393).

Var. *litigiosa* (Chaubard). *C. litigosa* Chaubard in Herb. sec. Lager in Nyman, Consp. p. 781 (1882). — A. u. G. I. c. p. 42, 43.

[**B** Bozen: Gebüsch am Guntchna, Haslach (F. Saut. 5 p. 353). Ein von Herrn Dr. F. Sauter mitgeteiltes Exemplar ist nach Vollmann für sicheres Urteil zu jung, aber wahrscheinlich *C. Leersii* subvar. *subramosa* Vollmann l. c. p. 73, 80.]

G „Val Vestino in pratis sol. calcareo 800—1000 m s. m. Majo 1882“ (Porta Hb. F. als *C. litigosa* Chaub., übrigens schon bei Sard. 3 [1881] p. 78 publiziert), an Wiesen- und Wegrändern bei Bolone 600—700 m (Porta b. Kn. 2^a Nr. 308, 2^b IX. p. 51 als *C. divulsa* var. *Chaberti*). Dr. F. Vollmann bemerkte zu den letzteren beiden Exemplaren: „steht zwischen *C. divulsa* var. *typica* und var. *guestphalica*. Die Form ist schlanker als der Typus mit weicheren Blättern, ohne jedoch an *guestphalica* heranzureichen“. Vollmann 3 p. 79 sagt hierüber: „Schließlich ist der *C. litigosa* Chaubard . . . zu gedenken, die für die Umgebung des Dorfes Bolone im Thal Vestino angegeben wird. Wo die authentischen Exemplare dieser Pflanze liegen, ist mir unbekannt. Porta hat an dem bezeichneten Orte fleißig gesammelt; was er sandte und mir unter dem Namen *C. litigosa* zu Gesicht kam, war teils *C. contigua*, teils *C. Leersii* var. *angustifolia*, teils *C. divulsa*“.

— *C. brizoides* \times *contigua*.

I An einem Zaune im Volderwald (Grembl. Hb.), bei der Borgias-Kapelle daselbst (Grembl. b. Murr 20 p. 46). Wohl nicht Bastard!