

T Trient (Gelmi 3 p. 35); Sardagna, Kalisberg (VL), Palazzo delle Albera (Gelmi b. Sard. Hb.); Borgo (Ambr. b. C. & A. Per. 4 p. 466; Montini b. Bertol. 2 X. p. 66); Suerta, Gavanello, Mandrighe, Val di Sella (Ambr. 4 I. p. 291).

Var. *simplex* Peterm., *C. paniculata* b. *simplex* Peterm., *C. paniculata simplicior* Anderss. — A. u. G. l. c. p. 46.

L Bei Kaisers (Murr).

I In Afing (Murr 20 p. 46) und unter der Gallwiese bei Innsbruck (Murr 11 p. 238 u. l. c.).

M Platzers, Schlucht ober Grissian (Lad.).

23. (394.) *C. diandra* Schrank (1781). *C. teretiuscula* Good. (1794). — A. u. G. l. c. p. 48.

Wie vorige Art.

V Riede bei Bregenz (Saut. 11 p. 28, 29; b. H. 1 p. 926; Cust. b. Döll 1 p. 135 u. b. H. l. c.; Bruhin b. Rich. 2 p. 79); Feldkirch: Frastanzerau (Kemp 1 p. 124).

O Nauders (Tpp. Hb. F.).

I Seefeld (K. 14 p. 366, Hb.; S. Hb. F.; Murr 20 p. 46); Afing (K. 86; Murr 11 p. 239 u. l. c.); Torfmoor unter dem Lanserkopf i. J. 1839 (Hfl. b. H. 1 p. 1498, Hb. F.), Lans i. J. 1852 (Glanz in Hb. Grembl.), hier neuestens nicht wieder gefunden (Murr 20 p. 46), in einem Sumpfe an der Ellbögenstraße oberhalb Igls (Murr); Thierburg (Grembl. Hb.); Trunajoch bei Trins 1830 m (K. 86).

U Moosental bei Rattenberg (Längst b. H. 1 p. 1498; Woynar in Hb. Schönach).

K Am Schwarzsee (Ung. 8 p. 279; Trst. b. H. 1 p. 926, Hb. F.).

M Vinschgau (Fech. 5 p. 118); Möser gegenüber Gargazon (Lad.), Andrianemoos (Lbd. b. H. 1 p. 926).

E Brixen: Teiche von Naz (Bachl. 1 p. 81).

P Antholzermoos (H. 1 p. 1498).

D Möser bei Nikolsdorf (Außerd. b. H. 20).

[**B** Bozen: der Standort Frangartermoos (H. 1 p. 926) gehört nach dem Exemplare zu *C. paniculata*.]

T Monte Bondone (Fech. 5 p. 118; b. Bertol. 2 X. p. 67; b. Ambr. 4 I. p. 293; Gelmi 3 p. 75; Sard. Hb.); Gräben von Piné (Fech. locis cit.). — Der Standort Val di Sella: C. & A. Per. 4 p. 466 gehört nach Ambr. l. c. zu *C. paniculata*.

R Monte Baldo: oberhalb San Giacomo (Fech. 5 p. 118; b. Ambr. 4 I. p. 293).

24. (395.) *C. curvula* All. — A. u. G. l. c. p. 50.

Auf sonnigen Rücken und Kämmen der höheren Urgebirge in geschlossenen Rasen eine der Carex firma analoge Formation bildend, mit Strauchflechten, Euphrasia minima, Senecio carniolicus, Phyteuma hemisphaericum als charakteristischen Begleitpflanzen (vergl. K. 9 p. 273).

V Freschen (Cust. b. Saut. 11 p. 28, wozu Rich. 2 p. 79 ein „²“ setzt); Alpe Walfagehr am Arlberg (Schramm 1 p. 44), Albona-Alpe (Rich. 3 p. 132); Versailspitze (Rompel b. Rich. 1 p. 85; Rich. 3 p. 132); Vergaldnerjöchl (S. [1887] b. Rich. 1 p. 85; Ender ibid.).