

F Vaëlerjoch in Fassa (Eschenl. b. H. 1 p. 929); am Lago di Colbricecon bei Paneveggio 1925 m (Ambr. 4 I. p. 297); Primör: bei Caoria (Ambr. b. Bertol. 2 X. p. 48), bei Fiera 700 m und im Val Asinozza 1200 m (Paol. 1 p. 7, 11), Calaitasee (Pfaff).

G Piano di Val di Genova (Sard. Hb.); Nambino (C. & A. Per. 4 p. 466).

T Fersina-Tal (Sard. Hb.); Pinè; Valsugana: Cinquevalli, Montalone, Setteselle, Castell'Alto oberhalb Telve, Bienno (Ambr. 4 I. p. 297, Hb. F.), Montalone (Parolini; Montini b. Bertol. 2 X. p. 48), Caldonazzo (Kot. Hb.).

R Acqua d'oro im Val Aviana am Monte Baldo (Hfl. Hb. F.). Hierauf bezieht sich das „Val'Aviana (Poll.)“ bei H. 1 p. 929, während Pollini von dieser Pflanze keine Erwähnung macht: siehe 1 p. 114; 3 III. p. 61.

Forma *bracteata* Murr in Deutsche bot. Monatschr. XVIII. (1900) p. 195.

I Hall: ganz einzeln im Walde oberhalb Windegg (Murr 66 p. 195).

Var. *argyroglochin* (Hornem.), *C. argyroglochin* Hornem., *C. leporina* β *argyroglochin* Koch. — A. u. G. l. c. p. 53.

I In Wäldern am Glungezer (Murr 9 p. 72).

P Sehr schön 1853 im Walde südwestlich von Bad Maistatt (H. 20).

D Lienz: am Ufer des Tristacher Sees (F. Saut. 5 p. 353).

T Fornace (VL. 7, Hb. F.).

26. (397.) *C. stellulata* Good. (1794), *C. echinata* Murr. (1770) sine descr. — A. u. G. l. c. p. 54.

Auf feuchten, moorigen Triften, torfigen Wiesen, an quelligen Orten bis in die Alpenregion.

V Häufig bis in die unteren Alpen (Saut. 11 p. 29, 31; Cust. b. Döll 1 p. 140; Kemp 1 p. 124; Hasler 1; Zimmerm. 1 p. 8; Rich. 2 p. 79).

L Alpe Söhen bei Vils (Fröl. b. Kögl 2 p. 240).

O Landeck (S.); Fließ (Hellw.), Obladis (Mik 3 p. 74); Kühetai 2000 m (K. 86), Sölden, Vent (Tpp. 1).

I Nördlich des Inn: Seefeld (K. 34 p. 366; Murr 20 p. 46 etc.); Walderalpe (Grembl. Hb.); verbreitet in der Mittelgebirgs- und Vor-alpenregion des Centralalpengebietes; tiefste Punkte: Afling 590 m (K. 86), Lemmenhof bei Innsbruck 620 m (Murr); höchste: Alpein 2000 m (K. 86), Pfandleralpe 2050 m (K. b. S. 4 p. 382), Lichtsee in Obernberg 2100 m, Klammeralpe in Navis 2100 m (K. 86).

U Große Zemm im Achenal (K. 86); Sonnwendjoch (Längst b. H. 1 p. 1499), um Brixlegg, Wörgl und Kufstein bis unterhalb 500 m herab (Längst l. c.; Hepp. b. H. 1 p. 1499; K. 86; Hb.; Eigener); Tristenspizze in Alpach (Längst b. H. 20); Schwarzensteingrund (K. Hb.).

K Die gemeinste Segge auf jedem Moorboden bis in die Alpen (Ung. 8 p. 279; Trst. b. H. 1 p. 928, Hb. F.).

M Matschertal (Tpp. b. H. 1 p. 928); Mutspitze, Spronsertal, Haflinger-alpe (Entl. 1 IV. p. 13).