

I Unter den Zirlermähdern gegen Zirl (Murr 8 p. 169; 20 p. 46); Ranggen (Reis. b. H. 1 p. 1499; S. Hb. F.); Sellrain 750 m (Kot. Hb.); Völs (Handel 2 p. 28), am Geroldsbach (Kot. Hb.; Handel 4 p. 293); Innsbruck (Hepp. b. H. 1 p. 1499); Kolbenturm bei Hall (Grembl. in litt.; Murr 20 p. 46), Vögelsberg (Handel 4 p. 293).

U Rattenberg: in der Mauk (Längst b. H. 1 p. 1499), Reinthalerseen (Schönach Hb.).

K Kitzbühel: am Schattberg (Ung. 8 p. 279; Trst. b. H. 1 p. 928, Hb. F.).

M Meran: Plaus, Algund (Pfaff), Schloß Tirol (Tpp. b. H. 1 p. 928), Küchelberg, Maiserwaal, Katzenstein (Entl. 1 IV. p. 13); Lana (Tpp. l. c. u. Hb. F.), Burgstall (Entl. l. c.), Nals, Gargazon (Pfaff).

D Im Moose bei Lengberg, dann zwischen Nörsach und Nikolsdorf (Außerd. b. H. 20).

N Faè bei Cles (Loss Hb. F.).

B Sarntal: am Straßenrande vor Halbweg (S. Hb. F.); Bozen: an Gräben mit fließendem Wasser, z. B. an der Straße links außer Gries gegen den Strasserhof und im Gandelhofe, am Kühbacher Weiher etc. (H. 1 p. 928, Hb. F.), Quelle vor Runkelstein (K. Hb.); Neumarkt (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 300).

F ? Fassa (Ambr. b. Bertol. 2 X. p. 70, doch nicht bei Ambr. 4 I. p. 300); Caoria gegen Canal San Bovo (Fech. b. Ambr. l. c.).

G Zwischen Rendena und Tione (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 300).

T Trient: bei Vela und Roncafert (Gelmi 3 p. 35; 10 p. 174.); Caldonna-See (Kot. Hb.), Calceranica (Ambr. 4 I. p. 300), Lavarone (Graziadei 1 p. 14), Savaro bei Borgo (Ambr. b. H. 1 p. 1499 u. l. c.).

R Rovereto (Hepp.).

× — **C. axillaris** Good., *C. vulpina* × *remota*. — A. n. G. l. c. p. 70.

V „An feuchten Plätzen der rechten Au der Bregenzner Ache bei Bregenz unter der Brücke [ober Kennelbach] große Rasen bildend“ (Saut. 11 [1837] p. 28). Diese Angabe wird vom Autor bereits 14 [1839] p. 272 mit den Worten berichtet: „Ist nur eine üppige, vieljährige Form von *remota*“; und im Mscr. erscheint denn geradezu statt *C. axillaris*, letztere in erstetierter Arbeit fehlende Art. — Demgemäß ist daher auch die Stelle bei Maly 1 [1848] p. 32: „In pratis paludosis Tyroliae. (Sauter)“ zu beurteilen.

35. (406.) **C. stricta** Good. — A. u. G. l. c. p. 83.

In Sümpfen mächtige Rasen („Zsombék-Formation“ nach Kerner, „Riedkegel“ am Bodensee: Schroet. & Kirchn. 1 II. p. 55) bildend.

V Gemein in den sumpfigen Niederungen (Cust. 1 p. 87; Saut. 11 p. 5, 28, 29; b. H. 1 p. 931; Kemp 1 p. 124; Hasler 1; Rich. 2 p. 79; Schroet. & Kirchn. 1 II. p. 55); eine kleine Form am Freschen (Cust. 3).

I Seefeld (K. 14 p. 366; Murr 20 p. 88); Leibfling bei Zirl (Reis. b. H. 1 p. 1500), Kematen, Afling, Ulfiswiese (K. 86), Amras (Schpf. 1 p. 320; Hfl. Hb. F., richtig bestimmt; Grembl. Hb. F. als *C. Buxbaumii*; Murr l. c.), Vill. Lans (Hfl. Hb. F. als *Carex* — resp. *C. caespitosa* und danach b. H. 1 p. 932 als *C. vulgaris*; K. 86; Grembl. Hb. F. als *C. Buxbaumii*; S. Hb. F.; Peyr. b. DT. 9 p. 81); Thaur (Grembl. Hb.), Hallerau (DT. Hb. Gymn.), Thierburg im Gnadenwald (K. 86); Schwaz, Stans (Reis. b. H. 1 p. 1500, Hb. F.); Gleinsermoor bei Matrei 1600 m (F. Saut.); Trins 1150 m (K. 86).