

41. (412.) *C. Buxbaumii* Wahlenb. — A. u. G. l. c. p. 105.

Auf moorigen Wiesen, in Torfmooren, an Seen.

O Nauders (Tpp. b. H. 1 p. 933, Hb. F.).

I Seefeld: am Rande des Sees (K. 14 p. 366, Hb.; Murr 20 p. 88; S.); in der Nähe der Station Kematen beim Standorte der *Gratiola officinalis* (Zimm. Hb. F.), Afling, stellenweise sehr zahlreich (Murr 11 p. 239; 20 p. 88), am Amrasersee sehr häufig (Glanz b. H. 20), Lanser Torfsumpf (Murr 20 p. 88), ?Villermoor (Grembl. 12 p. 18; ein bezügliches so bestimmtes Exemplar im Hb. F. ist jedoch *C. stricta*!), Sumpf an der Ellbögenstraße ober Igls (Murr).

U Bei Wörgl (Hepp. b. H. 1 p. 1500).

M Reschensee 1475 m (K. 86); Hafling (Tpp. b. H. 1 p. 933).

E Brixen: in den Sümpfen bei Naz (Bachl. 1 p. 82).

D Lienz: in der Pfister (F. Saut. 5 p. 353).

B Ritten: zwischen 1230 und 1450 m z. B. in der sogenannten Grube hinter Rappesbühl im Sumpfe, in der Wiese rechts und links vom Wege ober dem Kemater Kalkofen, dann unter Pfaffstall rechts am Alpenwege (H. 1 p. 933, Hb. F.), Wolfsgruber See (F. Saut. 5 p. 353); Deutschnoven (Viehwh. b. H. 1 p. 1500).

T Pinè: al Laghestel di Nogarè (Gelmi 10 p. 175, in Hb. Sard.).

Var. *oenipontana* Grembl. in Baenitz Hb. Europ. Liefg. XVIII. Nr. 1719 (1874), Liefg. XLIV. Nr. 4524, in Progr. d. Ober-Gymn. Hall 1876—77 p. 18, b. Murr in Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. (1891) p. 88; nach H. Christ in Bull. soc. bot. Belg. XXVII. (1888) II. p. 165 mit var. *macrostachya* Hausskn. [wo?] identisch, was Appel in Mitth. Geogr. Ges. Jena VIII. (1890) Bot. Ver. Gesamthür. p. 43 bestreitet, — A. u. G. l. c. p. 106.

„Differt a specie genuina stigmatibus 2 et 3 et quidem in eadem spicula & alia positione florum ♂ & ♀; spicula suprema plerumque inferius est ♀. reliquae apice ♂. Ceterum *C. Buxbaumii* valde similis. — Differt a *C. pseudo-Buxbaumii* Winkler (5. b. Zeitschr. 1868 Nr. 3) radice repente“ (Grembl. in sched. lithogr.).

I Innsbruck: im Villermoor mit der Art (Grembl. 12 p. 18; b. Murr 20 p. 88; 76 p. 154, Hb. F.).

42. (413.) *C. alpina* Swartz b. Liljeblad (1798), *C. VahlII* Schkuhr (1801), *C. Hausmanni* Tpp. in Hb. — A. u. G. l. c. p. 107.

An feuchten, steinigten Plätzen der Alpen- und Voralpenregion; an feuchten Waldstellen.

O Nauders gegen Langtaufers 1840—2200 m zahlreich und 1—1.5 Fuß [3—5 dm] hoch (Uechtr. 1 p. 249; b. H. 20); Oetztal: am Gufalarberge bei Rofen 2200 m (Tpp. b. H. 1 p. 934, Hb. F.), Thalleitspitze (K. Hb.).

M An feuchten Stellen des Matschertales 1900 m, September 1843 (Tpp. Hb. F.; b. Rchb. 7 VIII. (1846) p. 16, fig. 588; b. H. 1 p. 934), an feuchten Waldstellen der Alpen bei Laas, September 1843 (Tpp. Hb. F.; b. H. l. c.) [bezieht sich wohl auf vorigen Standort]; Bilsberg bei St. Gertraud (Fech. b. Ambr. 3 p. 394; 4 I. p. 308; b. Bertol. 2 X. p. 72); Ulten gegen Martell und gegen Val di Sole (Fech. b. Maly 1 p. 34; Fech. 5 p. 119).

D Winnebachelalpe 22—2400 m (Hut, 6 p. 54, Hb. F.; b. H. 20; Schönach 2 p. 20), hintere Winnebachelalpe sehr häufig am Bächlein