

F Fassa: Durontal (Lb. b. H. 1 p. 1500 b. Nr. 1989; Osterm. 1 p. 156), am Marmolatagletscher (Fech. 5 p. 119); Fleims: Paneveggi (Eichenf. 3 p. 34); Primör: Campai (Schunck 1 p. 339).

G Val Rendena (Gambillo 1 p. 121); Monte Pisgana (Rota 2 p. 89); unter dem Mandrongletscher (Sard. Hb.); Val Lorina (Lbd. 6 p. 139).

T Nardemolo im Val di Palù und Alpe Sassorotto (Ambr. b. H. 1 p. 1500 nach Autopsie; ersterer Standort findet sich jedoch bei Bertol. 2 X. p. 75, wo diese Art und *C. atrata* auseinandergehalten werden unter *C. atrata*).

?**R** Monte Baldo (Schaubach 1^b IV. p. 351).

Var. *Wolffii* Kneucker in Bull. soc. Murith. XIX/XX (1892) p. 80.
Ränder der Bälge gelb.

I Langental in Stubai (S. Hb. F.).

45. (416.) *C. parviflora* Host (1801), *C. nigra* Bellardi b. All. (1785) non L. — A. u. G. l. c. p. 109.

Auf feuchtem, humusreichem Boden der Alpenregion, vorzüglich in schattigen Mulden und Gräben, mit *Polytrichum septentrionale*, *Salix herbacea*; doch auch an sonnigen Lagen zwischen *C. firma*, selbst in Felsenritzen; wohl ausschließlich über kalkführenden Substraten.

V Zerstreut auf den höheren Alpen (Rich. 2 p. 79); Formarinalpe (Rich. 1 p. 85), Arlberg; Gamperdonatal (Kemp 1 p. 124), Lünsersee (Glanz 1 p. 87), Tilisuna (Rich. 1 p. 85); Monteneu 1700 m (Bornm.), Ganerajoch (S. Hb. F.).

L Rauheck bis zur Spitze 2400 m (Bornm. 1 p. 40).

O Oberpatrolalpe bei Zams (Hellw.); Samnaun (*Vulpus* 8 p. 312), Geisbleisenkopf bei Nauders 25—2700 m (Freyn 5 p. 317).

I Hohe Munde (Hellw. b. Murr 13 p. 49); verbreitet in der Solsteinkette (Andr. Saut. 2 Nr. 194; Roth b. H. 20; Gsaller 8 p. 43; Kot. Hb.); Stanserjoch bei Schwaz (Schm. b. H. 1 p. 934); verbreitet in den Kalkgebirgen von Sellrain bis zum Brenner 1730—2590 m (Hfl. b. H. 1 p. 934, Hb. F.; F. Saut.; K. 49 p. 187; 86; Murr 13 p. 49; S. 4 p. 383); Patscher Mühlthal (Kot. Hb.); Hippold im Wattentale 2630 m (Handel 4 p. 294); Tarntalerköpfe 23—2500 m (K. Hb.); Duxerjoch (F. Saut.; Peyr. b. DT. 9 p. 81); Vennatal (S. 2 p. 52, Hb. F.), Kraxenträger, auf Gneiß (Grembl. Hb.).

U Sonnwendjoch (K. Hb.); Hinterkaiser (Eigner); Zillertal (R. & J. Hinterh. 1 p. 234), am Hennensteigel in Naßdux (Hfl. b. H. 1 p. 934, Hb. F.), Duxerferner (K. 86).

K Auf den höchsten Schiefergebirgen, Geisstein (Ung. 8 p. 280), Geisstein bei 2200 m (Trst. b. H. 1 p. 934, Hb. F.).

M Schlinig (Tpp. 1); Kurzras im Schnalsertal (Artzt 1 p. CCXXXVII), Eisjöchl, Sprons—Lazins (Lbd. 10 p. 663, 662); Stilsferjoch (H. 1 p. 934, Hb. F.; Freyn 5 p. 319 etc.); Sulden; Laasertal, Zefriedferner (Tpp. b. H. 1 p. 934, Hb. F.); Hinteres Ulten (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 311).

E Wolfendorn (Peyr. b. DT. 9 p. 81), Zeragalpe (Murr Hb. F.), Hühnerspiel 22—2600 m (K. 86); Wildkreuzspitze (K. Hb.); Steinwend in Schalders (Gand. b. H. 1 p. 1500; Bachl. 1 p. 82); Peitler (Außerd. b. H. 20).