

Höchste beobachtete Standorte: **I** Hochalpe im Karwendel 1800 m (Eigner); Serles 1736 m (K. 86); **U** Juifen im Achantal 1687 m (K. 86); doch allem Anschein nach viel höher gehend; Facchini 5 p. 120 sagt: „ab imis vallium ad summam alpes“; „in regione Ficus Caricae et ad nives perennes“.

Lusus androgyna Rehb. — A. u. G. l. c. p. 135.

D Virgen am Iselufer (Gand).

B Bozen: trockene Hügel am Guntshna (F. Saut, 5 p. 353, Hb. F.), Kampill (Kot. Hb.).

T Trient: Cognola (Sard. Hb.).

R Ceniga bei Drò (Kot. Hb.); Castione bei Mori (Sard. Hb.).

Lusus aggregata Rehb. — A. u. G. l. c. p. 135.

B Bozen: trockene Hügel am Guntshna (F. Saut, 5 p. 353).

Ein *Lusus* „spicis femineis compositis“:

B Geierberg bei Salurn (H. Hb. F.).

Monströse Formen, besonders in Hinsicht auf die Zusammensetzung der Geschlechter sind vielfach zu finden (Murr 20 p. 90).

Var. *pallida* Beck, *C. flacca* ♂ *pallida* Beck. — A. u. G. l. c. p. 135.

B Bei Neumarkt: „forma spicis viridibus“ (Fech. 5 p. 120).

Var. *melanostachya* Uechtr., Hsm. Mscr., *C. flacca* f. *melanostachya* Uechtr. b. Fiek (1881), *C. flacca* var. *melaenocarpa* Murr in Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. (1891) p. 90. — A. u. G. l. c. p. 135.

V Dornbirn im Ried und in den Auen an der Ach (Zimmerm. 1 p. 8).

O Arzl bei Imst (Kot. Hb.).

I Schloßwald bei Zirl 1038 m (Kot. Hb.); Bettelwurf im Halltal (Murr 20 p. 90).

P Bei Bad Altprags i. J. 1864 (H. 20).

B Roßwiesen bei Bozen (Kot. Hb.).

R Torbole; Villa Lagarina (Kot. Hb.).

Var. *thuringiaca* (Schkuhr), *C. thuringiaca* Schkuhr (1808), *C. glauca* var. *Thuringiaca* Aschers. et Gr., *C. glauca* ♂ *sphaerostachya* Lange (1856), *C. glauca* var. *oogyna* Murr in Deutsche bot. Monatsschr. IV. (1886) p. 166, *C. flacca* var. *oogyna* Murr in Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. (1891) p. 90. — A. u. G. l. c. p. 136.

I Innsbruck: gegen die Zirlermähder (Murr 8 p. 166; 20 p. 90; 66 p. 195), in der Allerheiligenklamm und ober Weiberburg (Murr 20 p. 90; 66 p. 195).

R Arco (Diettr.).

Eine Var. ♂ *major* erwähnt Custer in Neue Alpina I. (1821) p. 89 vom Rheintale.

Var. *clavaeformis* (Hoppe), *C. clavaeformis* Hoppe, *C. flacca* var. *clavaeformis* Murr in Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. (1891) p. 90, *C. glauca* A. I. b. *claviformis* Aschers. et Gr. — A. u. G. l. c. p. 136.