

**V** Dornbirn (Zimmerm. 1 p. 8 als Form der *C. pendula*); Feldkirch: Gurtisspitze (Aichinger 2 p. 291).

**O** Kaunertal: vor Kaltenbrunn (Hellw.); Nauders (Uechtr. 6 p. 249).

**I** Im IBtale des Haller Salzberges (Zimm. Hb. F.; Murr 20 p. 90).

**U** Achentäl: quellige Stelle am Westufer des Sees (K. Hb.).

**E** Brixen: am Eisakufer unterhalb Milland, sparsam; auf feuchten Wiesen der Kalkalpen in Innerafers (Bachl. 2 p. 18).

**P** Nicht selten (Hut. 6 p. 55); Mühlwald 13—1700 m (Außerd. in Hb. K.).

**D** Virgen (Gand.); Glocknergebiet (Hinterh. & Hut. 1 p. 563); Schobergruppe (Weinl. 1 p. 64). Kreuzberg in Sexten 1770 m (Hut. in Hb. K.); Lienz: Wälder bei Kreit (F. Saut. 5 p. 353; das Exemplar von Scheitz in Hb. F., siehe H. 1 p. 942 ist typische *C. glauca*); Kreuzkofelgebiet (Keil 8 p. 161).

**B** Klobenstein am Ritten, hier und da in lichten Wäldern an feuchten Stellen gegen die Alpe (H. 1 p. 942); hinteres Tiersertal (F. Hoffm. 1 p. 27); Bozen: einmal an einem Wassergraben im Talferbette (H. 1 p. 942).

**T** Um Trient: Kalisberg, Monte Vaccino, Salëbach, San Bartolamteo, Chedul (VL. Hb. F., rev. Murr).

Italienisches Tirol (Gelmi 10 p. 177).

60. (431.) *C. erythrostachys* Hoppe, *C. flacca* var. *erythrostachys* Aschers. — A. u. G. l. c. p. 137.

**I** Innsbruck (Schönach Hb.; Kot. Hb.); Egerdach (Grembl. Hb.); Schwaz (Reis. in Hb. Grembl.).

**U** Unter dem Hinterkaiser (Kot. Hb.).

**M** Laaser Moos (Tpp. b. H. 1 p. 942, rev. Murr).

**D** Virgen: am Iselufer (Gand.).

**B** Um Bozen (H. 1 p. 942; Kot. Hb.).

**R** Torbole; Brentonico; Terragnolo (Kot. Hb.).

— *C. cuspidata* Host, *C. glauca* B. *cuspidata* Aschers. et Gr. — A. u. G. l. c. p. 138.

„Memorabilis varietas [*C. glaucae*] est glumis cuspidatis et aristatis, distincta ab alia forma glumis muticis, acutis vel obtusis“ (Fech. 5 p. 120). Doch kaum die echte Pflanze, welche bisher nur in Südfrankreich, Istrien und Dalmatien gefunden wurde.

61. (432.) *C. panicea* L. — A. u. G. l. c. p. 141.

Auf feuchten Triften, in Mooren, Waldsümpfen, an Ufern, Quellen, Bächlein, stellenweise auch auf ganz trockenen, mageren Triften, selbst auf Nardus-Wiesen.

**V** Häufig bis in die Alpen.

**L** Vilsalpsee in Tannheim (Zimm. Hb. F.); Reutte; Weißensee am Fern (S.).

**O** Obladis (Mik 3 p. 74); Imst (Lutt. b. H. 1 p. 941); Buchen bei Telfs (K. 86).

**I** Verbreitet; doch in Stubai nur bei Mieders und am Gleinserssee (K. 86) beobachtet. Höchster Standort: Krimpenbachalpe am Rollkogel 1930 m (K. 86).