

Auf steinigen Böden, mageren Triften, trockenen Wiesen der Alpen und Voralpen, über kalkhaltigen Gebirgsarten.

V Häufig (Rich. 2 p. 80); Dornbirneralpe (Saut. 43 als *C. varia*), Freschen (Cust. b. H. 1 p. 944); Hochkrummbach (S.); häufig durch das ganze Illgebiet bis tief in die Täler herab (Kemp 1 p. 124; Hasler 1; Kn. 1 p. 410; F. J. Winter 1 p. 357). Eine Form mit sehr verlängertem, steifem Stengel auf Titisuna (Cust. 3; b. Rich. 2 p. 80).

L Salober bei Vils (Fröl. b. Kögl 2 p. 240), Tegelberg (Rottenb. 2 p. 152).

O Nauders (K. 86); „Krähkogel bei Umhausen“ (Zucc. 1 p. 260).

I Leutasch (K. Hb.); häufig in der Solsteinkette bis 850 (Kot. Hb.) resp. 900 m herabsteigend (Murr 20 p. 123), so in der Kranebitterklamm (Murr 8 p. 164), Mühlauerklamm (K. Hb.), auf Triften oberhalb des Absamer Schießstandes, ca. 700 m (Engenst.); verbreitet auf den Kalkbergen des Gschnitztales (F. Saut., K. 86 u. Hb., Zimm. Hb. F. etc.) vom Tale 1250 m (S. Hb. F.) bis auf die Kuppe der Garklerin 2470 m (K. 86). Auf Schiefer: Längental in Lisens, Alpein in Stubai (K. Hb.), Laponeswasserfall in Gschnitz 1600 m (K. 86). Neunerspitze (Hfl. b. H. 1 p. 944, Hb. F.), Glungezer (Kot. Hb.), Pfons bei Matrei 1000 m (S. Hb. F.), Mieslkopf 1700 m (Kot. Hb.), Grünhergalpe in Navis (S. Hb. F.).

U Achental (Längst b. H. 20, K. 86, S. Hb. F.) bis 979 m herab (K. 18 p. 38); Rattenbergeralpen (Längst b. H. 1 p. 1502); Kaisergebirge (K. Hb.; Hofer 1 p. 36); Zillertal (G. Hoffm. 1^a I. 2. p. 224 als *C. varia*), Hinterdux (Längst b. H. 20).

K Auf allen Alpen: Kaiser, Salve, Staffkogel, Bischof, Horn, Kleiner Rettenstein (Saut. 7 p. 463, 465; Ung. 8 p. 281; Trst. b. H. 1 p. 945), Geissstein (Saut. 4 p. 416; Waldm. 1 p. 323).

M Schlinig (Tpp. 1); Matsch in Erlenauen (Tpp. Hb. F., wozu wohl das „Langtaufers“ b. H. 1 p. 945 gehört); Zilalpe (Elssm. 2 p. 403 als *C. ferruginea*, neben *C. Miolichhoferi*). Mutspitze (Entl. 1 IV. p. 27); Ortlerstock auf Kalk (Tpp. 1, b. H. 1 p. 945, Hb. F.; Giovanelli b. H. 1 p. 945; Peyr. b. DT. 9 p. 82); Ifinger (H. 1 p. 945, Hb. F.).

E Hühnerspiel (K. Hb.); Pfitsch (K. Hb., Hibsch 1 p. 117); Schalders; Afers (Gand. b. H. 1 p. 1502, Hb. F.; Bachl. 1 p. 83), Plose (Kleb. 1 p. 67).

P Gemein (Hut. 6 p. 55); Kasern in Ahrn (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 347), Mühlwald (Rederl. b. H. 20); Geiselsberg (Wulf. 4 p. 763; b. H. 1 p. 945), Prags (H. 20, Hb. F.); Welsberg (Hell b. H. 1 p. 945); Toblacheralpe (Hell Hb. F.).

D Innervillgraten (Scheitz b. H. 1 p. 945); Virgen (Gand.); Matreier Tauern (Hornsch. 1 p. 329); Glocknergebiet (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 347; Hinterh. & Hut. 1 p. 563); Schobergruppe (Scheitz Hb. F.; Weinl. 1 p. 62, 64); Kreuzkofelgebiet (Keil 8 p. 161).

N Monte Tonale (Rod. & Ven. 2 p. 22, Sard. Hb.), Cima Nalbioldaselbst (VL Hb. F.); Val Cercena in Rabbi (Tpp. 1); Cima di Trenta, Scaletta di Bresimo, Laugenspitze (Loss Hb. F.), Fontana Maora bei Cles, Monte Peller (Loss Hb. F.); Rücken des Gantkofel (Lbd. 14 p. 315), Mendel (Pfaff).

B Penserjoch in Sarntal (K. Hb.); Villanderer- und Rittneralpe (H. 1 p. 945; 20); Schlerngelände (Elssm. 2 p. 408 als *C. sempervirens*; C. H. Schultz 1 p. 603; H. 1 p. 945; Lbd. 8 p. 441; VL Hb. F. etc.); Petersberg (Thaler b. H. 1 p. 1502); Latemar (H. 1 p. 945).