

Forma *transiens* Kneucker, Caric. exs. Nr. 205 (1900), Allg. bot. Zeitschr. VI. (1900) p. 8.

V Am Alfenzbache bei Stuben 1400 m auf steinigem und grasigem Boden (Murr b. Kn. 2^a Nr. 205, 2^b p. 8; b. Rich. 4 p. 432).

Var. spadicea (Lam. et DC.), *C. spadicea* Lam. et DC., *C. ferruginea* β *spadicea* Koch. — A. u. G. I. c. p. 178.

Tiroleralpen (Host 2 IV. p. 51; 3 II. p. 603.

Monte Baldo (DT. 5 p. 335).

81. (452.) *C. refracta* Willd. (1805), *C. tenax* Reuter (1856), *C. ferruginea* auct. pl. trid. — A. u. G. I. c. p. 179.

M Gall bei Tisens an Kalkfelsen, in der Voralpenregion stellenweise sehr häufig, oberes Prissianertal (Lad.).

B Ratzen (Christ b. Aschers. 18 p. 261), Schlern (Reuter, Huf. ibid.); Mendel (Lad.): im Furgglautale und ziemlich zahlreich in einem anderen gegen Ueberetsch abfallenden kleinen Tale bei 1600 m (Pfaff.).

G Monte Tombéa (Reuter b. Aschers. 18 p. 261).

T Trient: am Bondone gegen Garniga nuova (Murr 60 p. 103); am Chegul auf berastem felsigem Terrain und unter Gebüsch 900—1000 m (Murr 60 p. 103; 113 p. 2; b. Kn. 2^a Nr. 206, 2^b VI. p. 43).

R Val di Ledro (Porta b. Aschers. 18 p. 261; Hb. Sard.); Monte Baldo (Böckeler 2 XLII. p. 135).

82. (453.) *C. Kernerii* Kohts in Oesterr. bot. Zeitschr. XX. (1870) Nr. 6 (Juni) p. 164, *C. alpigena* Kern. ibid. Nr. 6 (Juni) p. 187. *C. brachyrhyncha* Gsaller ibid. Nr. 7 (Juli) p. 199 als *C. glauca* × *ferruginea*, ibid. p. 292 als selbständige Art: siehe Murr in Oesterr. bot. Zeitschr. XLI. (1891) p. 124, Progr. Oberrealsch. Innsbruck 1890/91 p. 56, Deutsche bot. Monatsschr. XII. (1894) p. 21, Allg. bot. Zeitschr. I. (1895) p. 76, *C. hispidula* (*fimbriata*) Kern., Mscr. und b. Sarnth. in Stubei (1891) p. 384 non Sehkuhr (Gaud.). — A. u. G. I. c. p. 179.

Wie *C. ferruginea*.

V Berguntalpe im Kleinen Walsertale (S. b. Murr 88 p. 56); einzeln am Alfenzbache bei Stuben (Murr 60 p. 154).

O Am Almajurjoch im Stanzertale (Murr 13 p. 48; 26 p. 21); Fimberalpe in Paznaun (Peyr. b. DT. 9 p. 82, Hb.).

I Unter der Höttlinger Alpe 950 m (Gsaller 1 p. 199; 4 p. 292, Hb. F.), ober der Höttlinger Alpe (Murr 26 p. 21; 44 p. 123; b. Kn. 2^a Nr. 204, 2^b VI. p. 8); zahlreich am Haller Salzberg gegen das Thörl 1600 m (Murr 13 p. 48; 20 p. 124; 32 p. 75, Hb. F.); im Gerölle am Aufstiege zum Lafatschjoch (Murr 26 p. 21; b. Kn. I. c.); Saile (Murr 20 p. 124), Hoher Burgstall: an feuchten, grasigen Plätzen der Nordseite 22—2500 m mit *C. parviflora* i. J. 1869 (K. 49 p. 187; 86, Hb.; b. Kohts 1 p. 165; b. S. 4 p. 384), am Aufstiege von der Waldraast zum Blaser (Murr 20 p. 124), an letzteren drei Standorten in Menge.

M Franzenshöhe am Stilfserjoch (Peyr. b. DT. 9 p. 82, Hb.).

E Platzerberg bei Gossensaß (Murr).

D Haunold bei Innichen (Murr 26 p. 21).