

**F** Fassa: Chiarlong, Larzonei; Fleims: Bellamonte, Paneveggio; Primör (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 356; Gelmi 10 p. 178).

**G** Torsmoor bei Fiavé (Gelmi 12 p. 236).

**T** Bondone (Gelmi 10 p. 178); Pinè (C. & A. Per. 4 p. 468); oberhalb Povo gegen den Cimirlo-Sattel (Gelmi 15 p. 76).

95. (466.) *C. pseudocyperus* L. — A. u. G. l. c. p. 208.

An Gräben, Ufern, Sumpfrändern.

**V** In Gräben bei Fussach (Saut. 11 p. 13, 28; 43; b. H. 1 p. 950); Tisiserau bei Feldkirch (Kemp 1 p. 124); bei Mauern in Liechtenstein (Hasler 1).

**I** Innsbruck: Abzugsgräben des Amrasersees (DT. in Hb. Gymn. [1864]; Zimm. Hb. F.; Murr 20 p. 126), zahlreich im Sumpfe am Fuße der Lanserköpfe (Grembl. Hb. [1871]; Murr 1 p. 15; 20 p. 126; S. b. K. 78<sup>b</sup> Nr. 1896, 78<sup>b</sup> V. p. 93, wo es irrig Völs heißt!), an einem Bächlein zwischen Lans und Aldrans i. J. 1865 (DT. b. Murr 1 p. 15), Waldstümpfe bei Lans (Benz Hb. F.).

**M** Vinschgau (Tpp. b. H. 1 p. 950, ohne Beleg); Meran: Sumpfe am Sinnich und bei Gargazon (Lad.); im Andrianermoose (Lhd. 10 p. 659; b. H. 1 p. 1502).

**B** Bozen: Gräben im Frangarter Moose (Zallinger b. H. 1 p. 1502), an der Rodlerau (Hut. ibid.), in Gräben von Sigmundskron gegen St. Pauls (Fech. [1844] b. Ambr. 4 I. p. 359; Fech. 5 p. 121), am kleinen Montigglersee (H. 20), am Kalterersee (H. Hb. F.; Schönach 2 p. 20); zwischen Tramin und Auer schon im Jahre 1839 gefunden (Fech. locis cit.).

**T** Eichholz (Kot. Hb.): Seen von Pinè (Sard. b. H. 20), Laghetto di Madrano (Sard. 3 p. 78; b. H. 20; b. Gelmi 10 p. 178). Lago Pudra bei Pergine (Sard. Hb.).

**R** Gardasee [Tirol?] (Precht b. H. 1 p. 950; Clementi Hb. F.; Bracht b. Bertol. 2 X. p. 149); Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 950, Hb. F.).

— *C. saxatilis* L. — A. u. G. l. c. p. 209.

**D** Auf der Kerschbaumer- und Laserz-Alpe (Rschf. 2 p. 143; 3, an letzterer Stelle mit dem Citate Scop., Fl. Carn. II. Nr. 1154).

Eine nordische Pflanze, welche dem Alpengebiete fehlt.

96. (467.) *C. rostrata* Withering (1787), *C. obtusangula* Ehrh. (1791), *C. ampullacea* Good. (1794). — A. u. G. l. c. p. 209.

In Sumpfen, an Gräben, Ufern.

**V** Häufig im Rheintale und Walgau (Rich. 2 p. 80); Bregenz (Saut. b. H. 1 p. 950); Dornbirn (Zimmerm. 1 p. 9); Feldkirch (Kemp 1 p. 124; Hasler 1); Warth 1500 m (S. b. Rich. l. c.).

**L** Reutte (Kink b. H. 1 p. 950, Hb. F.).

**O** Fliess (Hellw.).

**I** Leutasch (Hellw.), Seefeld (K. 34 p. 366, Hb. etc.); Zirl (Kot. Hb.); Wildsee am Roßkogel (Hfl. 51). Sellrain 1375 m (Kot. Hb.). Praxmar 1640 m (K. 86); um Innsbruck: Kranebitten (Kot. Hb.), Afling (Hfl. 51; K. 86), Arzl (Grembl. Hb.). Thaur (Pichler b. H. 20), südöstliches Mittelgebirge (Pichler l. c.; Murr 20 p. 126; Peyr. b. DT. 9 p. 82; S. Hb. F.); Stans bei Schwaz (Schm. b. H. 1 p. 950, Hb. F.); Stubai: