

K Kitzbühel: in Waldsümpfen auf Torfmooren, an Gräben nicht selten; häufig am Schwarzsee, im Winklerwald (Ung. 8 p. 287); Kirchberg, massenhaft im Walde hinter der Kirche (DT. Hb. Gymn.), am Schwarzsee (Saut. 7 p. 479; Trst. Hb. F.; b. H. 1 p. 829, VL., Roth u. Glanz Hb. F.); im Fichtenwalde gegenüber Paß Thurn [ca. 1270 m] (Arn. 4 XIV. p. 489).

D Lienz: auf feuchten Wiesen gegen den Gaimberg und unter dem Gränzmautante Kapau (Rschf. 2 p. 142);

101. Arum L., Aronstab.

1. (515.) *A. maculatum* L. — A. u. G. l. c. p. 375.

Auf schattigen Waldwiesen, besonders unter Laubbäumen, in Auen, Obstgärten.

V Im Rheintale und Walgau häufig, zuweilen zahlreich (Rich. 2 p. 74), Bregenz (Saut. 11 p. 16; b. H. 1 p. 829, Hb. F.; DT. 2 p. 279); Dornbirn: leg. Winder; am Fuße des breiten Berges bei Haslach und Klien, Spätenbach und Hackwald (Zimmerm. 1 p. 4), Kummenberg (Schönach), St. Arbogast zwischen Götzis und Klaus, Rankweil (Rehst. b. H. 1 p. 1486; Hasler 1); Illgebiet: häufig in den Niederungen (Kemp 1 p. 120), Feldkirch an vielen Orten (Hasler 1; Schönach), Schellenberg (Hasler 1); Galgentobel bei St. Gerold (Bruhin 7 p. 127); Bludenz (Hasler 1).

I In mehreren Gärten und Obstangern wie wild, doch sicher ursprünglich angepflanzt und dann verwildert: Hötting (Pichler Hb. F.; Murr 1 p. 14; 10 p. 216), im Garten des Servitenklosters zu Innsbruck (Glanz b. H. 20); Schwaz (Schm. b. H. 1 p. 829, Hb. F.), daselbst im Franziskanergarten (Grembl. 1 p. 35), im Garten des Apothekers Würstl (J. Zimm. in Hb. Gymn.). Schon im Hb. Sauerwein vorhanden.

U Zuverlässig wild in der Erlenau bei St. Margarethen gegenüber Jenbach, nicht bei Rottenburg oder Rattenberg (Murr 21 p. 100 und in litt.); hier auch mit innen dunkelrotviolett gefärbter Kolbenscheide: var. *roseum* Grembl. in Oesterr. bot. Zeitschr. XV. (1875) p. 21 (Hörmann b. Grembl. 7 p. 21; Grembl., Murr b. Murr 9 p. 71); Ebbs (Harrasser b. H. 1 p. 829, Hb. F.).

[**B** Bei Sigmundskron zur versuchsweisen Verwilderung angepflanzt (Lbd. 14 p. 309).]

G Val Vestino: bei der Pfarrkirche von Magasa (Fech. 5 p. 116; b. Ambr. 4 I. p. 790), Alle Valli bei St. Antonio (Porta b. H. 20), Val Vestino 800—1000 m: var. *roseum* Grembl. (Porta Hb. F., Hb. K. u. nach Hut. in litt.).

T Lavarone (Graziadei b. Gelmi 10 p. 157); im Valle la Gallina zwischen Bienno und Pradalano an der rechten Seite des Chiappena-Baches (Ambr. b. H. 1 p. 829; Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 789, Hb. F.; b. Bertol. 2 X. p. 247; Fech. 5 p. 116, 149).

R Ballino bei Riva, häufig in Hecken und Gebüsch (Gelmi 12 p. 234). „Misit ad me Franciscus Calceolarius pharmacopaeus Veronensis e monte Baldo allatum“ (Mattioli 1 ed. 1565 p. 595), Monte Baldo; ai Pianetti bei Brentonico, maculis nigris; al Cerbiol 13—1400 m, foliis immaculatis forma immaculata (Schott), *A. immaculatum* Schott, *A. maculatum* forma vulgaris immaculata Engler — A. & G. l. c. p. 376 (Poll. 1 p. 109, 114; 3 III. p. 115), al Cerbiol und Gambon (Goir. 3 XVIII. p. 206), am Artilone (Calzolari 1^b p. 20,